
Tractatus, (cui Titulus, *Processus
Integri in Morbis ferè Omnibus
Curandis*) à Clarissimo D. D.
Thomâ Sydenham Conscriptus
Imprimatur.

Thomas Burwell, Præses.

Humphrey Brook,
Jos. Clerk,
Guilelmus Briggs,
Fredr. Slare, } Censores

Datum 18o. Die *Augusti*
A. D. 1693. in Comi-
tiis Censoriis ex Aedi-
bus Collegii nostri.

ess
rib
o. D
ptu

n for

C

N

A

Q

D

In

c
Processus Integri
M O R B I S

Ferè Omnibus

C U R A N D I S,

A. D. *Thoma Sydenham*, M. D.

Conscripti.

Quibus accessit graphica Sym-
ptomatum delineatio, unà cum
quamplurimis Observatu dignis.

N E C N O N

De *Phthisi* Tractatulo.

EDITIO TERTIA.

L O N D I N I :

Impensis *Sam. Smith & Benj. Walford*,
ad Insignia Principis, & *J. Knapton*, ad
Insigne Coronæ in Cœmeterio
D. Pauli. 1705.



Cat. AL

S

mi
à C
rio
mo
ac
mo
am
mu
ce
fin
æg
pa
ba
ut
qu
M
be
di
qu
ni
qu



Amice Lector,

Specimen habes Praxeos eximiae, in dilectissimi filii M. D. usum, cautè & diligenter excogitatum, suâ ipsius manu conscriptum, mihi autem pro familiaritate istâ quâ omnes excepit concessum à Cl. Sydenham, Viro sanè, cui vix ætas superior parem dederat, vel postera datura est, non modò in arte suâ mirâ sagacitate, & ingenii acumine singulari, conspicuo: sed & probis moribus, & in humanum genus, studio & amore insignibus adeò, ut apud omnes summum sui reliquerit desiderium: Cujus præcepta licèt animo meo & imo pectore infixæ sint, nè tamen fortè fortunâ in mei ipsius & ægrorum detrimentum. excidant memoriâ parùm fidâ, typis haud ita pridem mandabam, exemplaribus circiter viginti impressis, ut amicis quoq; inservirem. Nescio autem quo pacto in lucem irrepsit publicam inter *Miscellanea Curiosa* superioris anni Norimbergæ editum; sed ineptâ mole inutile. Prodiit tandem eo modo vestitum ut tibi sit in quovis loco paratum; figmentis cerebri vanis & futilibus sciolorum dogmatis nequaquam refertum, nec hypothesi placidâ solidis

at videtur rationum momentis undequaque
constipatâ superbiens; humile autem & mo-
destum accuratè morbos depingit, & accura-
tiùs adhuc medetur; in id solum sollicitum,
ut innotescat quod natura faciat aut ferat.
Et si verum loqui liceat, modò partium situs
noveris, pateant tibi per Symptomata ægri-
tudines, (quod assiduâ ediscas observatione)
scias deindè veram & genuinam medendi
methodum per diætam & Pharmaciam adhi-
bere, felicissimus eris practicus, & tibi & in-
firmis optimè consoles. Parùm interim tuâ
refert utrum Alkali peccet an Acidum, num
in Spiritibus Animalibus, an in ipso sanguine,
aut in recondito aliquo Viscere delitescat
morbi minera; unde de Periodico Intermit-
tentium reditu doctè satis & prolixè possis
differere; dum interea ipsa Febris sine ullis
ambagibus, inquietudine, siti, calore, pulsa
celeri, nausæâ, cæterisque Symptomatis, etiam
astantibus palam est, & apertè dignoscitur:
Hinc sæpius mirari subit, quamobrem anxie
ita & scrupulosè immediatas & proximas
morborum causas, dum Medicinam pertra-
ctandam suscipiunt, indagare fatagunt, & è
tenebris istis, quibus natura obduxit, irritò
licet conatu, eruere, gravi & subactò
judicio viri & in praxi versatissimi; satis in-
rerim gnari se latere vel quævis obvia. Undè
enim dimanat graminis viridis, aut albus ni-
vis color? Quid est quòd humana anima ra-
tiocinari

e
-
-
,
r.
s
-
)
li
-
-
â
n
e,
at
-
is
is
fu
n
:
e
as
a-
e
to
to
a-
de
i-
a-
ri

tioci
ri fu
esset
enim
laeri
enun
mor
mo
gres
ars
ter
filiis

N
de
rene
liri
mis
pen
me
& i
pra
las
qua
spi
len
ann
tu
tun
U
Pri
&

tiocinari nequeat dum adhuc Infantes aut Pue-
ri sumus? Unde forma tua Specifica? Sati-
us esset Medicum quàm Philosophum agere (quis
enim unquam Cartesium sibi Medicum vo-
luerit?) minutissima Phœnomena planè & ritè
enumerare, & remedia quibus unusquisque
morbus faciliùs cedat, candido & sincero ani-
mo proponere; ita tandem limites suos præter-
gressa, quibus angustis nimis jam includitur
ars nobilissima, omnibus, quaquaversum pa-
tet orbis, fœliciter satis & prosperè salutem,
filijs autem suis honores summos conciliabit.

Meditabatur paulò ante obitum, tractatum
de Phthisi peritissimus medicus; in perqui-
rendo naturæ methodum; quî morbos amo-
liri studet, ut adjutrices porrigeret manus, &
miseriis hominum subveniret, diu noctuque
pensitabundo, & anxio animo, exercitatissi-
mus; hinc fidelissimarum observationum serie
& irrefragabili edoctus experienciâ, medicinæ
praxin ornavit, & ad saniores reduxit regu-
las; sed vœ tabidis, dum hujusmodi nun-
quam intermissis studiis detenti & defatigati
spiritus, solitis non vacabant excubiis, trucu-
lentissimus hostis, *Podagra*, quæ per multos
annos obsederat, & debilitaverat artus, impe-
tu facto in interiora viscera irruit, per vomit-
um & secessum enormiores intentans mortem:
Unico autem morbo nescit cedere Medicorum
Princeps, sed cum malorum cumulo accessit
& *Renum Calculus*, qui corrasit vasorum of-
culis,

culis, sanguinem liberaliùs, quàm senectus tulit, urinæ permixtum effudit, se jam non ampliùs opponens, nec vitæ, nec mortis cupidus, placidam, & pacatam, expiravit animam. Nè tamen auxilio prorsus destituantur tabidi fragmenta quædam, quæ autorem ubivis sapiunt, in primo saltem morbi stadio plerumque pronècia, (neq; enim fas est, quod ægiotanti proximo opituletur, celare,) in publicum prodeunt; ut exindè pateat quàm accurata, & omnibus numeris absoluta, si modo Deus Opt. Maximus concessisset vitam, expectari potuisset Phthisiologia.

Quid in Febris, Variolis, Morbillis, acutis cæteris, ut & Chronicis sanandis valuit optimè meritis autor noster, sequentes indicant paginæ. Regimen & Diætâ instituuntur aptissima; præscribuntur remedia pauca, sed necessaria; nec in Pharmacopolarum lucrum excogitata, nec inani ostentationi composita: sitibundis ægris (eodem modo quo & ipse sirm suam restringere solitus erat) cerevisiam tenuem affatim & pro libitu hauriendam, undè mirè reficiuntur & refrigerantur, concedit; nec immanitate plùs quàm barbarâ, precibus eorum surdus, Apozemata & Julapia præ ingrato sapore fastidita substituit; maximam adhibet cautelam ne exæstuans nimis, vel igne luculentiori, vel stragulorum onere, p'ùs adhuc incalcesceret, vel à propinatis forsan remediis eum in finem, ut
per

us
on
bi-
ni-
n-
o-
ra-
ft,
e,)
m
fi
m,

ru-
nit
li-
n-
u-
m
n-
uo
at)
u-
ge-
m
ata
b-
x-
ra-
vel
ur
per

per
adh
ans
Ph
gui
aut
& p
mul
laru
spec
gue
qua
faci
rand
exp
lum
mal
mor
enti
Mel
itaq
igno

per poros eliminetur materia morbifica cruda adhuc & inconcocta, quæ tamen hæc datâ ansâ concitato motu cerebrum petit, undè Phrenesis aut Coma, aut extravasato sanguine deturpant cutim maculæ purpureæ, aut eruptiones, quas vocant miliares, collum & pectus ubivis obsident. Nunquid ad amissim magis depingi poterat quàm Variolarum historia? eruptionis diem in utraque specie designat, pustularum ingenium ad unguem describit, quo tempore incipiat, & quamdiu continetur Salivatio, quo iterum faciei manuumque tumor se prædat; quid tandem quolibet die expectandum, disertè explicat. Paregoricorum usum, quo emolumento judicent Practici, primus persuasit, malum, ingerendi Cardiaca ante eruptionem, morem, undè sæpè accersitum fuerit confluentium genus, meritò primus improbavit. Meliùs autem hæc ex ipso fonte. Valeas itaq; amice Lector, & sicubi scateant Mendæ ignoscas,

S. M.

Amico suo Integerrimo M. D.
Expertissimo Domino S. M.

*S*olum sequaces prætulimus diu
Cum Medentes ; Compar habebitur
Qui clariorem te, minori
Reddidit hoc, Medicina ! Libro.

Non hic tumentis Mole superbiens
Blattis futurus Præda opulentior :
Sensu sed ætæ Ditioni
Conciliant sibi Verba Pondus.

Frustrà molesto vasta Volumine
Lustres Galeni scripta ; Minutule
Acumen huic majus Tabella ;
Se stupet hinc Medicina totam.

Hic non remoto sordidus Angulo
Sensim fatiscet ; Sedula strenuè
Manus quotannis, Spe perenni
Deteret, auctior ut resurgat.

Applaudè Votis Turba Medentium :
Non Febris illum, Morbus atrocior
Haud afflet ullus ; Commodis qui
Immoritur satagendo Vestris.

Sic Vovet,

Christophorus Crelle, M. D.

D.

.D

D

Ambl

Ang

Apo

Aftl

Can

Ch

Ch

Ch

Co

Co

Co

Co

Di

Di

Dy

Ep

Fe



I N D E X.

A		Febre Constitutionum
D E Abortu	Præca-	num variarum, 16
vendo	P. 64	Febribus à dentitione
Ambustis	87	ortis 82
Anginâ	30	Febre depuratoriâ, 12
Apoplexiâ	46	Febre Erysipelatosâ,
Asthmate	92	28
C		Febre Hecticâ Infan-
Canis rabidi morsu,	tum 82	
	90	Febre Intermitt. 16
Chlorosi	84	Febre Pestilentiali, 14
Cholerâ Morbo	56	Febre Scarlatinâ, 22
Choreâ sancti Viti,	44	Fluore albo 76
Colicâ biliosâ	55	Furfure sive Porrigine
Colicâ Hystericâ,	61	capitis 90
Colicâ Pictonum,	58	G
Contusionibus	89	Gonorrhœâ virulentâ
D		70
Diabete	77	H
Diarrhœâ	51	Hæmoptoë 85
Dysenteria	ibid.	Hæmorrhagiâ narium
E		83
Epilepsiâ	Puerorum,	Hæmorrhoidum dolo-
	79	re 78
F		Hæmorrhoidum fluxu
Febre Stationariâ,	19	immodico, 79
		Hy-

Hydrope 66

Hypochondriacâ affectione 5

Hystericâ Passione, ibid.

I

Ictero 63

Iliacâ Passione 58

L

Lochiorum fluxu immodico 64

Lochiorum suppressione 65

Lue Venereâ 74

M

Maniâ communi 88

Mensium fluxu immo- dico 60

Mensium suppressione 85

Mictu Sanguineo à Renum calculo, 50

Morbillis 32

N

Nephritico Paroxysmo 49

O

Ophthalmiâ 48

P

Paralyfi 93

Peripneumoniâ nothâ, 25

Phthisi 93, 98

Pleuritide 23

Pruritu serino 30

Puncturâ tendinis, 87

Podagrâ 102

R

Rachitide 80

Rheumatismo 26

Remediorum formulae 1

S

Scorbuto 96

T

Tussi 93

Tenesmo 51

Tussi Puerorum convulsivâ 83

V

Variolis 34

Ulcere Vesicæ 91

Vomitu sanguinis, 85

Uteri procidentia, 49

93
na,
25
98
23
30
87
02

60
26
u-
I

96

93
5 I
n-
83

34
91
35
.,
49

Me

Rx

Rosar

Rx
Metan
um.
pende
gum l

Rx
aq. Ci
ß, J
Dama
w. ve



Medicamentorum quædam formula in praxi magis familiares.

Potio Communis Purgativa.

℞ **T** Amarind. ℥ss. fol. Sennæ ℥ij. Rhei. ℥iſſ, coq. ſ. q. aq. ad ℥iij. in Colatura diſſolve Manna & Syrup. Roſar. ſolut. an. ℥j. m. ſ. Potio.

Emeticum Commune.

℞ Aq. Cardui Benedict. ℥ij, Infuſ. Croc. Metal. ℥j. Syr. Caryophyll. ℥ſſ, m. ſ. vomitorium. Sumat horâ 4^a. Pomeridianâ, ſuperbibendo poſt ſingulas vomitiones hauſtum largum liquoris poſſetici.

Julapium Perlatum.

℞ Aq. Ceraſor. nigr. lact. Alexeter. aa. ℥iij. Aq. Cinnamom. hordeat. ℥j. Margarit. præparat. ℥iſſ, ſacchar. Cryſtall. q. ſ. adde aq. Roſar. Damascen. ℥ſſ, ſ. Julap. de quo cap. cochlear. v. vel v, in Languoribus.

Jula-

Julapium Cardiacum.

℞ Aq. Lact. Alexeter. Cerasor. nigr. an. ℥iij,
aq. Epidem. Syr. Caryophyll. & de succo Citri,
an. ℥ss, m. f. Julap. de quo capiat sæpius.

Decoctum Diæticum.

℞ Rad. Sarsaparill. ℥vj. lign. Sassafr. &
China ana ℥ij. Glycyrrhiz. ℥j, coq. in aq. font.
Congiis ij. per horæ dimidium; deinde stent
clausè super cineres calidos per horas xij. postea
ebulliant ad tertiæ partis consumptionem; Cum
primum ab igne amoveatur, infunde sem. Anisi
℥ss, post duas horas coletur, & postea depuretur
per residentiam, & liquor reponatur lagenis vi-
treis probè clausis ad usum. Sit pro potu or-
dinario per xxx, dies.

Apozema Aperiens & Antiscorbuticum.

℞ Rad. gramin. Cichor. Fenicul. & rassa-
rag. ana ℥j, uvarum Corinthiac. & passul. enu-
cleat. an. ℥ij, fol. hepat. ling. cerv. & cap.
Ven. an. M. j. fol. Beccabung. sub finem addi-
M. ij. coq. s. q. aq. fontan. ad ℥ij, sub finem
adde vini Rhenani ℥ss. Colaturâ adhuc ca-
lente, infunde ad duas horas, vase clauso, Coch-
leatens. M. j. colatur. adde syr. è quinq; radic. &
è succo Aurant. ana ℥ij. aq. Cinnamom. hordea-
℥j, M. f. Apozem. Sumat ℥ss, manè &
5^a pomeridianâ per xiv, dies.

Eclegm

℞
Portul
crystal
horæ
recond
pius l

℞
an. ℥j
& per
moscha

℞
jujub.
ol. nuc
Loboch
eelegn
Sulphu

℞
nach.
Rhaba
℥ij, j
rantion
vj, Cer
re, &

Eclegma Incrassans in Tussi.

Rx Ol. Amygd. dulc. ℥j, Syr. Papav. Rhœad. Portulac. Fijub. & Loboch. sani, ana ℥ss, Sacchar. crystall. q. s. M. in mortario marmoreo ad integræ horæ spatium, & f. Linctus perfectæ mistus; recondatur in ollâ figulinâ, ad usum. Cap. sæpiùs lambend. è baculo Liquiritiæ.

Eclegma fortiùs incrassans.

Rx Conserv. Ros. rub. Syr. violar. & de Mecon. an. ℥j. sem. papav. alb. ℥iij, contundantur simul & per setaceum trajiciantur, deindè adde ol. nuc. moschat. express. gr. vj, f. Eclegma.

In Defluxione tenui.

Rx Conserv. ros. rub. ℥ij. Syr. de Mecon. & jujub. an. ℥j, Oliban. Mastich. & Succin. an. ℥j. ol. nuc. Moschat. per expressionem gr. vj. M. f. Loboch. de quo lambat sæpè; bis in die cap. eelegm. descript. cochl. j, instilland. Balsam. Sulphur. Anifat. à gut. viij, ad gut. xij.

Cerevisia Purgativa.

Rx Polypod. Querc. itj, Rad. Rhabarb. Monach. fol. sennæ & passul. enucleat. ana itss, Rhabarb. incis. & rad. Raphan. Rustican. an. ℥iij, fol. Cochl. hortens. salv. an. M. iv. Aurantior. incis. N° iv. infunde in Congiis v, vel vj, Cerevisiæ non lupulate, fermentationis tempore, & quando ad maturitatem pervenerit, sit pro potu.

potu ordinario per dies xiv, vel xxj, præcipue verò sumat haustum singulis Auroris.

Emplastrum Hystericum.

R Galbani in tinctura Castor. solut. ℥ co-
lat. ℥iij, Tacamahac. ℥ij, f. Emplast. pro um-
bilico.

Catharticum pro Infantibus tenellis.

R Syrup. Cichor. cum Rhabarb. Cochl. j, par-
vulum.

Decoctum Amarum Purgativum.

R Decoct. amar. duplicatâ senâ ℥iv, Syrup.
de Spinâ Cervinâ ℥j. Elect. de Succ. Rosar. ℥ij,
M. f. Potio.

Laudanum Liquidum Authoris.

R Vini Hispanici lbj. Opii ℥ij. Croci ℥j. pulv.
Cinnamomi, & Garyophyllorum, an. ℥j. infundan-
tur simul in B. M. per duos vel tres dies, donec
liquor debitam consistentiam acquirat; Cola-
tura servetur pro usu.

De affectione, in fœminis, hysterica; moribus, hypochondriacâ dictâ.

CUM à casu aliquo graviore molestum patitur humana anima, ataxiam concipiunt animales spiritus; urina subindè limpidissima copiosè excernitur; sanitatis recuperandæ spes omnis protinùs abjicitur, & tristissima quævis sibi ominantur ægrotæ; quamcunque corporis partem morbus infederit (plurimas autem infidet) symptomata ei parti competentia confestim arguent; in capite apoplexia, hemiplegiâ sortita, statim à partu adoritur; spasmi epilepsiæ per similes (vulgò uteri strangulatus, in quo venter & præcordia guttur versùs intumescunt) infestant; clavus hystericus, in quo dolor in capite atrocissimus, quem transverso pollice possis contegere, agrâ interim materiam viridem bili porraceâ parem evolvente, miserè excruciat; cordis palpitatio nem, tussim, passiones iliacam & colicam, nephritin, urinæ suppressionem æmulatur paroxys-

roxyſmus; vomitiones enormes, diarrhoeam
 ſubindè excitat; externè in carne muſculoſa
 nunc dolorem, nunc tumorem inducit in tibiis
 hydropis inſtar; nec (quod mireris) intactos
 dimittit dentes; dolor dorſi creberrimè ſa-
 vit; & ſæpè ſæpiùs adeò refrigerantur exter-
 næ partes, ut cadaver plane referant; in riſum
 & lachrymas effuſiſſimas ſine ullâ ~~cauſa~~
 ridiculè erumpunt; ptyaliſmus nonnunquam
 eo gradu laborantes afficit, ut Mercurio deli-
 butaſfacilè crederes. Dolores hyſterici, quam-
 cunq; partem obſident, ubi diſceſſerint, te-
 neritudinem, quæ tangi recuſat, relinquunt
 ac ſi verberatæ fuiſſent carnes.

Mittatur Sanguis ad ℥viij.

Empleſt. de Galbano umbilico admoveatur
 Sequenti manè aggrediatur uſum ſequentium
 pilularum;

℞ *Pil. Coch. maj.* ℥ij, *Caſtor. pulv. gr.* iſſ
Balaſam. Peruv. gutt. iij. f. *Pil. xij.* Cap. iſſ
 ſingulis vel alternis matutinis, pro ratione
 virium, horâ 4^a vil 5^a matutinâ, ſuperdoru-
 miendo.

℞ *Aq. Ruta* ℥iv. *Bryon. comp.* ℥ij. *Caſtor.*
nodulo ligat. & in vitro ſuſpenſ. ℥ſſ, *Saccha.*
Crystall. q. ſ. ſ. julap. de quo capiat cochl. iv, ve-
 l v, in omni languore. Poſt has pilulas ſumptas
 utatur ſequentibus;

℞ *Limatur. Chalyb. gr. viij. cum s. q. extract. Absinth. f. Pil. N° iij.* Sumat sum-
mande, & repetantur horâ 5^a pomeridianâ
per xxx dies, superbibendo haustum Vini
absinthitis.

Sin forma boli magis arrideat.

℞ *Conserv. Absinth. Roman. & Conserv. fla-
d. Aurant. an. ℥j, Angelic. condit. Nuc. Mos.
at. condit. & Theriach Andromach. an. ℥ss,
lv. Ari comp. ℥iij, Zinzib. condit. ℥ij, cum
q. Syrup. de succ. citr. vel, ejus defectu, Syr.
aurantior. f. Electuarius.*

℞ *Elect. præscript. ℥ij, limatur. Chalyb.
viij. cum s. q. Syrup. Aurantior. f. Bolus
mandendus mane & sero, superbibendo hau-
stum vini absinthitis, vel Cochl. vj. seq. In-
fionis.*

℞ *Rad. Angelic. Enul. campan. & Impera-
n. an. ℥j. fol. Absinth. vulg. Centaur. min.
arrub. alb. & Chamædr. an. M. j. Cort. Au-
nt. duor. incis. affunde vini Hispanic. q. s. +
supereminentiam duorum digitorum. Cole-
re tempore usus. Vel,
In Delicatulis Chalybs exhiberi poterit in
mâ pulv. sequentis;*

℞

℞ Limatur. Chalyb. probè trit, ℥j, pa
 Ari comp. ℥vj, sem. Coriand. præparat. An
 Fenicul. dulc. an. ℥ß. Cinnamom. acutiss.
 rall. rubr. præparat. an. ℥iij, Nuc. Mosch
 ℥ij, f. omnium pulvis subtilissimus, cui ad
 sacchar. albiss. ad pondus omnium, hujus cap
 Cochleari ℥ß, bis in die per 4 dies, tum
 bis in die per 40 dies, superbibend. Cochle
 seq. Julap. vel vini Absinthitis.

℞ Aq. Laet. Alexeter. ℥xij, Gentian. com
 ℥iv, Absinth. magis. comp. ℥ij, sacchar. alb
 q. s. f. Julap. Vel;

℞ Vini Rhenan. Absinth. ℥ß, aq. Gent
 comp. ℥ij. Syr. Caryophyll. ℥j. f. Julap.

℞ Myrrh. elect. Galban. & Asæ fatidæ,
 ℥j, Castor ℥ß, cum s. q. Balsam. Peruv.
 Pil. è singulis drachmis xij. Sumat iij, sing
 noctibus, superbibend. aq. Bryon. comp
 Cochl. iij, vel iv, per totum decursum hu
 processus.

Si Pilulæ Præscriptæ ventrem mover
 utatur sequentibus;

℞ Castor. ℥j. sal. succin. volatil. ℥ß,
 f. q. extract. Rutæ, f. pilule N° xxiv. C
 iij. singulis noctibus, superbibendo Jul
 hysteric. Cochl. iij. vel iv.

Sp. C. C. ad gutt. *xvj.* vel *xviij.* in aquâ
quâ appropriatâ sæpiùs exhibitus valde
confert.

Si verò his non cedat remediis, tum capiat
quentes pilulas ;

& Trochisc. de Myrrh. pulv. *℥j.* Balsam. sul-
fur. Terebinth. gut. *iv.* cum *f. q.* gumm. Am-
niac. solut. *f.* Pil. N^o *iv.* Cap. manè &
superbib. Julap. hysteric. Cochl *iv.* vel
instillando Sp. C. C. gutt. *xij.*

Electuarium Antiscorbutic. cum aquâ ibidem
scriptâ prodest in his affectionibus, ut &
electuar. corroborans cum additione Conserv.
h. hortens. *℥j.* pulv. Ari Compos. *℥vj.* super-
bendo præscriptam aquam.

At si affectus his non cedat remediis, eun-
tem est ad aquas ferreas ; & si neq; his, tum
Sulphureas, quales sunt Bathomenses.

Inter bibendum aquas ferreas hæc obser-
vanda ; si aliquod Symptoma gravius acci-
dit, quod potationi aquarum referri potest,
ut ab iis æger abstineat, donec Symptoma
id penitus evanuerit. Æger in earum usu
sex septimanas ad minimum, vel potius,
duos menses perseveret. Zinziber condi-
tum, vel Semina Carui Saccharata, ad calefa-
cendum ventriculum subindè sumat. Pilula
am hystericæ *ijj.* devorari possunt per pri-
mæ *x.* noctes, superbibendo Julap. hysteric.
Cochl. *iv.* vel *v.*

Quoad

Quoad usum *aquarum Bathoniensium*, duobus diebus bibat eas, ac tertio die per modum Balnei eas ingrediatur, atque ita alternatim per sex septimanas vel duos menses.

Si *Chalybs* justo plus corpus calefaciat, tamen per ejus usum, quartâ quâq; Aurorâ sumat *aq. mineralium purgantium* Itiv. Quæ tamen alvum moveant, haud tamen tumultuosa faciant, ut solent Cathartica ex officinis prompta.

Si *Chalybs* magnas perturbationes inducat, Laudanum *aq.* aliquâ hystericâ mistum, singulis noctibus ad tempus aliquod propinandum.

Cùm à morbi diuturnitate fractæ & atrox fuerint vires, venæsectio, & cathartica sunt præmittenda, sed à Chalybe statim incipiendum.

Ubi Symptomata sunt mitiora, satis sanguinem mittere, & alvum solvere ad *iiij.* vel *iv.* dein. pilulas hystericas ad diem manè & serò exhibere.

In dolore intolerabili, vomitione, & *Dysentericâ* enormioribus, exhibendum Laudanum & postea corroborandi spiritus, at modò vires liceat, antè usum Laudani, educatè venis sanguis, & Catharticum propinet in viraginibus præsertim, & sanguineo temperamento præditis, in debilioribus autem & haud ita pridem paroxysmum passis, si sit ventriculus Congio uno lactis cerevisiæ haui

di
od
na
r, r
fun
am
vuln
is
adu
m,
pin
e an
ica
m in
fatis
ad
die
x D
dant
odò
duca
vinea
eo re
aut
s, fu
revif
hau

tausto,
ere, •
el *Eleē*
uor, li
ulis *La*
lare.
• ulter
acabit
st, cā d
ulas v
form
arco v
q. Cin
ente,
Perd
lies pau
Hæc
emel p
us, cā
um e
ebellat
ngulas
olcam
m L
povend
itidim
Ther
ta, n
ām p
ctu o

(II)

nausto, & mox per vomitum rejecto deter-
gere, dein largam dosin *Theriac. Androm.*
vel *Elect. Orvietan.* imperare, & *Cochl.* ali-
quot, liquoris alicujus Spirituosi, cum pau-
culis Laudani liquid. guttulis, superbibenda,
sare. Quòd si ægra jampridem vomuerit,
& ulterius emeticis sollicitare periculo non
vacabit, Laudanum sinè morâ propinandum
est, eâ dosi, quæ Symptoma vincat, & post sin-
gulas vomitiones toties quoties repetendum,
in formâ potissimùm solidâ, vel in liquidâ, in
parco vehiculo, viz. gutt. aliquot in *cochl. j.*
q. *Cinamom.* fortior. ægrâ interim conquie-
scente, & caput immotum tenente.

Perdomito Symptomate, manè & serò, ad
pauculos continuetur usus Laudani.

Hæc duo diligenter notanda, quòd cum
semel post evacuationes Laudano uti cœperi-
mus, eâ dosi, atque illâ toties repetitâ, sumen-
tum est, donec Symptoma omninò fuerit
rebellatum, interjecto tantùm spatiolo inter
singulas doses, ut quid prior præstiterit ante
oscemus quàm alteram ingeramus, deinceps
in Laudano morbum aggredimur, nihil
providendum est, nihil evacuandum vel per
missimum enema.

Theriaca Andromachi crebrò, diuq; usur-
ata, magnum est in hoc, & aliis morbis
tam plurimis à coloris, & concoctionis de-
fectu ortis, remedium.

Vina Hispanica gentianâ angelicâ absinth
centaurio, corticum aurantior. flavedine, aliisque
corroborantibus infusis medicata, si ad ali
quot Cochlearia ter in die potentur, admo
dum conferunt, modo ægra tenui non fuerit
biliosoque corporis habitu.

Cortex Peruv. ad ℥j. manè & serò, per
septimanas aliquot deglutitus, præsertim in
spasmodicis hystericeis miras habet vires.

In tenui biliosoque corporis habitu possit
usurpari Diæta lactea, præcipuè in Colicâ
Hystericâ, si modò ea incommoda possint
superari, quæ primis ferè diebus apportant
quod nempe tum in ventriculo coaguletur
tum etiam viribus corporis, in statu confer
vandis, sustendendisq; minùs sufficiat.

Nihil tamen æquè sanguinem spiritusque
fovet, & confirmat, ac diu multumq; singulis
ferè diebus equo vehi; nec itinera in curre
facta suo carent successu.

*De Febre Depuratoriâ annorum 1661, 62,
63, 64.*

Si æger juvenis sit, extrahatur sanguis
brachio, & eodem die post aliquot horas ve
sequenti die duabus horis post leve prandium
*Emeticum ex infus. Croc. Metall. paratis Symplicibus
thogal. ℥vj. vel viij. ut quoties vomuerit, atque
alvum exoneraverit, è vestigio sumatur haustus,
exhibeatur; & post finitam operationem Emetici,
hoc vel simile paregoricum.*

uth
sq
ali
no
erit

per
in

offi
blic
ffim
rtat
etur
nfer

sq
gul
urn

2,

uis
as ve
dium
s
r, a
r ha
rati
m.
B& A

R
Laud
M. F.

Vo
pueru
tutis,
exhib

Po
duode
ma se

R
dis v
nar. C

Po
tatur
tur,
rata l
ducu

R
lect.
Bolus
biben

R
Aq.
Zula
H
circa

Rx Aq. Cerasor. nigr. ℥℥. aq. Epidem. ℥℥. Laudan. liquid. gutt. xvi. Syr. Caryophyll. ℥ii. M. F. Haustus.

Vomitoria **ex** infus. *Croc. Metall.* parata, puerulis, ullisve infra adolescentiam constitutis, vel minimâ quantitate, non est tutum exhibere.

Post hunc diem usque ad undecimum vel duodecimum singulis Auroris injiciatur enema sequens;

Rx Decoct. commun. pro Clystere ℥ij. (vel lactis vaccini eandem quantitatem) Sacchar. Culinar. & Syrup. violac. an. ℥ij. f. Enema.

Post dictum diem alvus constipari permittatur, quo materia febrilis citius concoquatur, ad quem etiam finem Cardiacâ moderata his ultimis diebus exhibita apprime conducunt; ut,

Rx Pulv. è chel. Cancrer. comp. gr. xio: Elect. de Ovo Dss cum f. q. Syr. Caryophyll. f. Bolus sumendus octavâ quâque horâ, superbibendo sequentis Julapii Cochl. vj, vel vii.

Rx Aq. Lact. Alexeter. Cerasor. nigr. an ℥ij. Aq. Epidem. & Syr. Caryophyll. an. ℥j. M. F. Julap. vel alia his similia.

Hac methodo sollicitè observatâ, usitatò circa xv. diem (tunc ex laudabili in urina separatione,

paratione, tum ex manifesta Symptomatum omnium remissione) tempestivum esse Portionem Purgantem communem exhibere percipies.

Accidit interdum, maximè in Senibus, curatâ Febre, & purgato corpore, ægrum nihilominus valdè debilem esse & quandoque tussi, interdum etiam screatu, magnam glutinosi viscosique phlegmatis copiam expectorare. Hoc in casu vinum Malaganum annosum, cum pane tosto ei immisso, bibat æger.

Si superveniat Iliaca passio, præscribatur Sal. Absinth. ℥j. ex Cochl. j. Suc. Limonum, manè & serò, intermediis temporibus cap. Aq. menth. stillatit. sine Saccharo, Cochl. aliquot, bis quâq; horâ. Dum hæc fiunt, catulus vivens nudo ventri indefinenter accumulabat. Postquam dolor cum vomitu, per biduum triduumve cessaverit, exhibeatur *Pil. Coch. mej.* in *Aq. Menth.* soluta, nec removendus catulus ante pilularum usum.

Ad recidivam præcavendam, persistat in usu prædictæ aquæ per longum tempus, & duplicatis pannis laneis ventrem à frigore defendat.

De Febre Pestilentiali 1665, 66.

Post venæsectionem in lecto celebrandam, æger stragulis obruatur, & Lacinia lanea
fin-

rn
o-
re
u-
n-
ue
lu-
ro-
an-
bat

run
im,
ap.
ch.
ca-
im-
du-
P.
mo-

t in
s, &
gore

lam.
anea
fin-

incipit
hoc vel

R T
Pulv. è
viij. Cr
lis, qu
bibend

R A
Siv. Ag
Si. M.
Si a
donec
proman
superin
Ince
salviâ
quantu
curalis
inuan
is ag
Ubi
istinu
egro f
utetur
cere
alè ha
sus en
urgat

incipiti alligetur ; tum, si vomitus non adsit, hoc vel simile Hydroticum exhibe.

R̄ *Theriac. Andromach.* ʒʒ. *Elect. de ov.* ℥j. *Pulv. è chel. cancr. comp.* gr. xii. *Coccinel.* gr. iiij. *Croc.* gr. iv. cum s. q. *succ. kermes, f. Be-* *lus,* quem sumat sextâ quâque horâ, superbibendo *Cochl.* vj. seq. *Julapii.*

R̄ *Aq. Card. Benedikt.* & *Scord. compof. an.* ℥iv. *Aq. Theriacal. stillatit.* ʒij. *Syr. Caryophyl.* ʒi. *M. F. Julapium.*

Si adsit vomitio, hydroticum differatur, donec solo tegumentorum pondere sudor promanare incipiat, lintheaminis parte vultui superinductâ.

Incepta Diaphoresis haustulis *Zythogalæ salviâ alteratæ,* vel *Cerevisiæ* cui macis aliquantulum incoxeris subinde repetitis ad naturalis dici spatium (i. e. horas 24.) est continuanda ; in sudore licet jusculis confortatis agrum reficere.

Ubi tumor enatus fuerit, venam aperire non sistinui ; per horas adhuc à finito sudore xxiv. agro se in lecto continente frigus cautè detur. Indusium sponte suâ in corpore arecere permittatur, potulenta omnia calidiussulè hauriantur, & *Zythogalæ salviâ alteratæ* usus etiamnum continuetur. In seq. luce potio surgat, communis exhibeatur.

Anni 1667, 1668. Febrim Variolosam & Variolas produxerunt.

Anni 1669, 70, 71, 72. Febrim Dysentericam.

Anni 1673, 74, 75. Febrim Comatosam.

Curationem febrium horum annorum nunc attingo; quoniam methodo in febre anni 1685, &c. descriptâ curari eas potuisse autumo.

De Febris Intermittentibus.

Cum rigore & horrore adortur paroxysmus, quibus mox succedit calor, & tandem sudor, & subsequens *επιρροή* licet in primis morbi diebus, Autumno maxime, aliquoties remissio potius quam intermissio persentiscitur. In calore æque ac in rigore vomiturit ut plurimum ac vehemente ægrotat miser cum siti & lingua arida. In tenera ætate abdominis inflatio, in adultorum tumor febris solutionem; tonsillarum dolor, raucedo, oculi cavi, facies Hippocratica, mortem denunciant.

R Cort. Peruv. subtiliss. pulv. ʒj. cum f. Syr. Caryophyll. vel de Resis sicca, f. Electuarium dividendum in xij. doses; quarum una capiat quartâ quâque horâ, superbibendo Vini cujuslibet haustum, incipiend. immediatè post paroxysmum.

a &
nte
n.
nc
am
al

oxy
hu
gia
ma
nte
in
ente
.
dub
laru
ocr

f.
ecia
una
do V
edia

Si a
rint, in
liquid.
sumpti
Ad
in qua
singulis
Sin

& C
caryoph
quarun

& C
rent si
manica
tertiâ v
Sin

Cortic
vel oE
Limon
Absinth
gutt. x
ac brev
aggred

In
quam
nemp
gi poss
Enema
duum,

Si autem præscripti boli ventrem move-
rint, in haustu Vini dentur gutt. x. *Laudan.*
liquid. singulis vel alternis vicibus post as-
sumptionem boli, ut opus fuerit.

Ad recidivam præcavendam (præcipue
in quartana) repetatur processus prædictus
singulis septimanis per tres alias vices.

Sin forma Pilularum magis arrideat,

R Cort. Peruv. pulv. ℥j. cum f. q. Syrup.
caryophyll. f. Pilulæ mediocris magnitudinis,
quarum capiat vj. quartâ quâque horâ.

R Cort. Peruv. pulv. ℥j. Vin. Rhenan. lbij.
Cent simul in Infusione frigida, & coletur per
manicam Hippocratis. Usus tempore cap. ℥iij.
tertiâ vel quartâ quâq; horâ.

Sin ob vomituritionem, ferè continuam,
Corticem deglutire nequeat æger, tum sexies,
vel octies, Spatio duarum horarum, *Succi*
Limonum recens expressi Cochl. j. cum Salis
Abinth. ℥j. assumat, dein Laudan. Liquid.
gutt. xvi. cum Aq. cinnam. fortior. Cochl. j.
sic brevi post, cessante vomitu, Corticis usum
aggrediatur.

In intermittentibus vernalibus, nonnun-
quam emeticum, tempestivè propinatum, ut
nempe ante paroxysmum negotio suo defun-
gi possit, felicissime successit. Nonnunquam
Enema in diebus intermittentibus, per tri-
dium, vel quatrimum injectum, Curatio-

nem absolvit. Quæ sequenti quoq; mod-
tentari potest.

℞ *Serpentar. Virgin. subtiliss. pulveris*
gr. xv. Vin. alb. ℥ij. Sumat duabus horis ante
Paroxysmum, & stragulis coopertus æge-
sudet per *ijj.* vel *iv.* horas, idem facient
per duas alias vices ante Paroxysmum.

Si ab ingeminatis paroxysmis summe debi-
lis fuerit æger ;

℞ *Conserv. Flor. Borag. Bugless. an. ℥j. con-*
serv. Anthos. ℥β. cort. citr. condit. Nuc. Moscha-
condit. Theriac. Andromach. an. ℥ij. confectio
Alchermes ℥ij. M. F. Opiata cap. ad quantita-
tem avellanæ, mane & vesperi, superbibend.
Cochlearia paucula, alicujus Eq. Epidem.
simplicioris, Saccharo edulcoratæ, interdici-
interim enematum usu.

Si sub morbi exitum occurrat hydrops
nondum tamen depulsâ Febre, curatio non
est instituenda remediis purgantibus, sed in-
fusionibus *rad. Raphan. Rostican. Summite*
Absinth. centaur. Min. Baccar. Juniper. cin-
rum genist. &c. in vino factis, exulante autem
Febre, Catharticis, & aperientibus.

Pro Infantibus Febre intermittente labo-
rantibus.

℞ *Aq. cerasor. nigr. & Vini Rhenan. an. ℥*
cort. Peruv. subtiliss. pulv. ℥ij. Syr. cary-
phy.

od

/e

un

ge

un

cb

cr

cl

lin

rit

end

m

di

rop

no

d in

mit

cim

uter

labo

n. 3

cary

phy

phyl.
ram
donec
stillat
rit,

Da

Ca
parit
ianus
& fa
inqu
omn
sicca
undi
lecto
gimi
nes
rube
solutu
initio
prov
mate
trans
M
retur
cultu
nans
fint.
thar

phyl. ℥i. *M. F. Julap.* Cap. *Cochl.* j. alter-
nive, pro ratione ætatis quartâ quâq; horâ,
donec Paroxyfmi non amplius difcrucient, in-
ftillando alternis vicibus, fi Diarrhœa adfue-
rit, Laud. liquid gutt. j. vel ij.

De Febre Stationaria, ab an. 1685, ad 90.

Calor & frigus fe invicem exeipiunt, artus
pariter & Caput dolent, pulfus interim ferè
lanus, nonnunquam tuſis, dolor circa collum
& fauces, exacerbatio Febris prope noctem,
inquietudo, fitis, lingua vel humida & ex
omni parte pelliculâ albâ & ſcabrâ veſtita, vel
ſicca, fulci coloris in medio, quam partem
undiq; cingit ſimbria inalbeſcens. A jugi in
lecto decubitu coma & phrenefis, à calido re-
gimine petechiæ, maculæ purpureæ, eruptio-
nes (quas vocant) miliares morbillis magis
rubentes, pulfus inordinatus, tendinum ſub-
ſultus, atque ita tandem mors. Sudores in
initio ſymptomatici divexant, qui ſi ab arte
provocentur, viſcoſi à Capite erumpunt, &
materiam morificam in Caput aut in artus
transferunt.

Mittat. Sanguis ad ℥x. è brachio. Reite-
retur Venæſectio, ſi modò reſpirationis diffi-
cultas, dolor Capitis inter tuſiendum lanci-
nans, & alia ſigna Peripneumonix nothæ ad-
ſint. In hoc caſu tam venæſectio quàm Ca-
tharſis repetenda, donec æger convaluerit.

Vesperis applicetur Epispasticum, & sequenti Aurorâ Potio Lenitiva præscribatur, quæ ad tertiam vicem alternis diebus repetatur, & horâ somni post Catharsin haustus pacificus propinetur.

R. *Aq. Paralys.* ℥.iii. *Syr. de Mecon.* ℥i. *Succ. Limon. recent. extract. cochl.* ii, *M. F. Haustus.*

Aphthæ & singultus sponte suâ post curationem febris supervenientes sponte evanescent; Si in longum tempus decurrant, faciliè fugantur *Cortic. Peruv.* ℥i. cum *Syr. Papav. Rhœad. q. s. in formam Electuar. vel pilular. redactâ, superbibend. haustum lactis deflorati.* Remedium hoc certissimè scopum attinget, si non frustrentur ejus vires ex jugi ægri in lecto decubitu.

Diebus à purgatione liberis sequentia præscribantur.

R. *Conserv. Lujul. & cynosbat. an.* ℥i. *conserv. Berber.* ℥ss. *crem. Tart.* ℥i. cum *s. q. Syr. de Limonib. f. Electuarius, de quo cap. ad magnitud. Nuc. Moschat. ter in die, superbibendo sequent. Julap. Cochl. vj.*

R. *Aq. Pertulac. Lactuc. Paralys. an.* ℥.ij. *Syr. de Limonib.* ℥ss. *Syr. Violar.* ℥j, *M. f. Julapium. Vel.*

R
r.
i.

z.
E.

O-
t;
n-
ad.
td,
e-
fi
in

ra-

ren-
q.
ap.
fu-

z.ij.
A.f.

R

R^x A
um, S
dum de
scribatu

R^x S
ij. m. f

Si fe
potione
ad dij,
est con
is, cum
Liquid
dent. 3

Dec
in aq.

albissim
visia t

Pos

agro,

timam

calum

dij, ve

um, p

In

confe

Empl

Rx *Aq. font.* ℥j, *aq. Rosar.* Succ. *Limonum,* *Sacchar. albiss.* an. ℥iv, *coq. lento igne dum despumaverint,* cap. ℥iij. *ad libitum.* præscribatur quoque seq. gargarisina.

Rx *Succ. Pomor. agrest.* ℥ss. *Syr. de rubo Ideæ* ℥j. *m. f. gargarisma.*

Si febris ita ventriculum infestet, ut æger potionem retinere nequeat, *Pil. Coch. maj.* ad ℥ij, exhibeantur, tum etiam hypnoticum est concedendum, v. gr. *Laudan. Londin.* gr. ss, cum simili quantitate *Mastic.* vel *Laudm.* *Liquid. gut.* xvij. in *aq. Cinnamom.* *hordat.* ℥j.

Decoctum album paratum ex ℥j, *C. C.* *usti,* in *aq. communis* ℥iij. *cocti* & *postea.* *Saccharo albissimo* *edulcoratum* sit pro potu, ut & *Cerevisia* tenuis pro libitu.

Post Catharsin his celebratam, concedatur ægro, Pullorum carnibus vesci, & post ultimam Purgationem modo febris aliquantulum deflagraverit, vini Canarini cochl. iij, vel iv, mane, & sero, ut & post Prandium, per dies aliquot propinentur.

In Phrenitide, ut & Comate, nihil perinde confert, atq; ægri caput radi, nullo admoto Emplastro, sed Pileolo tantum.

Si (quod foeminis hystericis quandoq; accidit) post venæsectionem, & purgationes hujusmodi iteratas, etiamnum duret, procurratque febris, modo signa Peripneumoniæ, & inflammationis circa partes vitales absint, singulis noctibus Paregoricum, & medicamenta hystERICA, bis vel ter in die injungantur.

De Infantibus febre Stationariâ laborantibus.

Hirudines duæ utrinq; ponè aures applicentur, dein Emplastr. Epispasticum cervicæ admoveatur.

Cerevisiâ, quâ Rhabarbarum fuerit infusum purgetur.

Si post Catharsin febris intermittere videatur, tum *Jalapium cum Cortice Peruviano* (in Capite de febre intermittenti pro infantibus descriptum) exhibeatur.

De febre Scarlatina.

Æstate exeunte, infantes præcipuè infestant. Rigent & horrent sub initium; nec tam admodum ægrotant; cutis universa maculis parvis, rubris, crebrioribus, latioribus & magis rubentibus quàm in morbillis, interstinguitur: Ad duos tresve dies persistunt quo quidem tempore evanescunt, & decedente subjectâ cuticulâ squammulis fursureis, ad instar farinæ, cutis conspergitur.

az
ne
re
no
ald
di

us
pli
vic

um

dea
(in
ibu

infe
c ta
ma
ribu
inter
tuna
dece
fura
r.

R & C

an. 38,

pulsis

rum u

do coc

R & 2

3ij, Sy

App

qualib

propin

verint,

Inte

& hon

calor.

sympt

hemer

utro c

omop

ctoris

Mater

& ten

mista

cocta

ti pa

dolor

tienis

afric

na fa

refrix

R. C. C. usti $\mathfrak{E}$ pulv. è Chel. cancr. comp. an. $\mathfrak{z}\beta$, Coccinel. gr. ij. Sacchar. Crystal. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$, M. f. pulvis subtiliss. in $\mathfrak{x}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$, Chartulas dividend. quarum unam cap. 6. quâque horâ, superbibendo cochl. ij, vel $\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$, sequentis Julapii.

R. Aq. Cerasor. nigr. aq. Lactis Alexeter. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}$, Syr. è succ. citri $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$, M. f. Julap.

Applicetur etiam Epispasticum cervici, & qualibet nocte paregoricum ex Syr. de Mecon. propinetur, & postquam symptomata cessaverint, purgetur æger.

De pleuritide.

Inter Ver & Æstatem dominatur. A rigore & horrore orditur, quos statim comitantur calor, sitis, inquietudo & cætera febrium symptomata; elapsis pauculis horis, æger vehementi dolore punctorio in laterum alterutro circa costas corripitur, qui nunc versus omoplatas, nunc spinam, nunc anteriora pectoris sese propagat, tussî crebrâ excruciat. Materia sputo rejecta in initio morbi pauca est & tenuis, & sæpe sanguinis particulis intermixta, progressu verò copiosior & magis concocta, sanguine etiam permixto. Febris pariter passu incedit cum tussî, sputo sanguinis, dolore, & pro ratione liberioris expectorationis sensim imminuitur; nunc alvus est astricta, nunc soluta nimis. Eductus è vena sanguis sevi liquati speciem præ se fert, ubi refrixerit.

Mitta.

Mittatur sanguis e brachio lateris affectu
ad ℥x.

℞ Aq. Papav. Rhæad. ℥iv, Sal. Prunel. ℥j
Syr. Violar. ℥j. M. f. Haustus, sumendus ita-
tim à prima venæsectione.

℞ Amygd. dulc. excorticat. N° v, sem. Mel-
lon. Pepon. an. ℥ss. sem. papav. alb. ℥iij, aq.
bord. Itiss, aq. Rosar. ℥ij, cum s. q. sacchar.
cand. f. s. a. Emulsio. Cap. ℥iv, 4^a quâque
horâ.

℞ Decoct. Pectoral. Itij, Syr. Violar. ℥j
Cap. Ven. an. ℥ss, M. f. Apozema. Cap. Itss
ter in die.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥j, Syr. Violar. ℥j
Cap. Ven. an. ℥j, Sacchar. Cand. q. s. M. f.
Eclegma, de quo sæpe lambat.

Oleum Amygd. dulc. per se, vel Oleum sem.
Lini recenter extract. exhiberi potest.

℞ Ol. Amygd. dulc. Lilior. ℥j unguent. Di-
althææ, an. ℥j, M. f. Linimentum, quo inun-
gatur latus affectum manè & serò, superim-
ponendo fol. Brassicæ.

Repetatur Venæsectio ad tres alias vices,
ad eandem quantitatem, quatuor diebus
continuis, ubi dolor & respirandi difficultas
fluant.

&

3
ta

M.

a

ba

que

E

tt

E

M. f.

sem

Di-

un-

rim-

ices,

ebus

altas

D:



In
emerg
friger
est, ru
ruffit,
nans
turbid
corum
spiritu
re sicc
quam
festò f
obscur

Mi
Die se

Ex
gues
3j. coq
Mann

Si v
Pil. co

Seq
ad ear
tatur
nis di
ration
non
semel

De peripneumonia notha.

Ingruente hyeme & sæpe sub ejus exitum emergit, insultu primo nunc incalescit, nunc friget æger, ex motu quolibet vertiginosus est, rubent & inflammantur genæ oculique, ruffit, & inter ruffiendum dolor capitis lancinans premit, potulenta vomitu rejicit, urina turbida est & intense rubet, sanguis pleuritico-
rum æmulus, anhelus crebrò & celeriter spiritum ducit, dolente thorace. Ab asthmate sicco plane distinguitur, quòd in isto nusquam comparent febris indicia, in hac manifestò se produnt, licèt minora longè & magis obscura quàm in peripneumonia vera.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad ʒx. Die sequenti æger hanc potionem sumat.

Rx Cassie extract. ʒj. Glycyrr. ʒij. ficus pingues N° iv. fol. senn. ʒ. iß. Agaric. trochiscat. ʒj. coq. f. q. aque ad ʒiv. in Colatur. dissolv. Manna ʒj. Syr. Rosar. solut. ʒß.

Si verò potionem assumere nequeat, Cap. Pil. coch. maj. ʒij. horâ quartâ matutinâ.

Sequenti die celebretur iterum venæsectio, ad eandem quantitatem; ac postero die repetatur Catharsis, quæ porrò repetenda est alter-
nis diebus, vel post majora intervalla, pro ratione virium; Atq; insuper si Symptomata non cessaverint, extrahatur iterum sanguis semel adhuc, bis, vel sæpius, diebus aliquot
inter-

interjectis, prout res postulaverit; sed ut plurimum venæsectio bis celebrata sufficiet. Interim, dum hæc fiunt, præsertim in diebus à purgatione vacuis, utatur *decocto Pectorali, Eclegmate & oleo Amygd. dulcium*, in Pleuritide descriptis.

De Rheumatismo.

Rigorem & horrorem & cætera febrium symptomata patiuntur, elapso die uno alterove (est & ubi citius) dolor adest atrox, nunc in hoc nunc in illo artu, in carpiis, humeris & genubus præsertim, vicissim hos relinquens & illos occupans, rubore, & tumore in parte, quam postremùm affecit, adhuc residuis. Febris sensim evanescit, manente dolore, quin & nonnunquam immaniùs sæviente. In lumbagine rheumatica immanis dolor adest, circa lumborum regionem fixus, nephritim mentiens, nisi quod æger non vomituriat, qui procumbere nequit, sed vel è lecto exiliat, vel super eodem erectus sedet, corpore perpetuâ agitatione nunc versùs anteriora, nunc posteriora inclinato. Sanguis pleuriticorum similis.

Mittatur Sanguis è brachio lateris affecti ad 3x.

Rx *Aq. Nymph. Portulac. Lactuc. an. ʒi. Syr. de Limonib. ʒiβ. Syr. Violac. ʒj. M. f. Gulap. de quo bibat ad libitum.*

Præ

n
2-
ac
is
ns
re,
is.
re,
In
est,
tin
iat
lia
per
und
um

ecti

3
M. J

Præ

Pra
Catapl
tincto

Die
trahat
terje
ries, f
secun
valla

Di
lacte
quens

Rx
Violan
nema

Si
tomia
tiam
tenta

Ca
vam
nocti

Si
becil
nequ
tiscon
reme
Scor

In
runt

Præscribend. *Emulsio 4. Sem. frigid. maj. Cataplasma è mica panis albiss. & lacte Croco. tincto applicetur parti dolenti.*

Die sequenti eadem sanguinis quantitas detrahatur ; atq; iterum, die uno vel altero interjecto, reiteretur, atq; porro quater vel pluries, si opus fuerit, hoc observando, ut post secundam Venæsectionem majora sint intervalla inter singulas sanguinis missiones.

Diebus à Phlebotomia vacuis Enema è lacte saccharato subinde injiciatur, vel sequens ;

R. Decoct. commun. pro Clystere Itj. Syr. Violar. & Sacchar. culinar. an. ℥ij. M. f. Enema.

Si Imbecillitas ægri repetitionem Phlebotomiæ non ferat, tum post secundam vel tertiam venæsectionem Curatio hac methodo tentanda.

Capiat alternis diebus *portionem purgativam communem*, donec convaluerit, & iisdem noctibus *Paregoric. ex Syr. de Mecon.*

Sin his remediis non cedat, & æger ob imbecillitatem evacuationes qualescunq; ferre nequeat, aggrediatur usum *Elect. & aq. Antiscorbutic.* in scorbuto descript. quæ etiam remedia locum habent in Rheumatismo Scorbutico.

In Juvenibus, atq; iis qui temperatè vixerunt, vino non plus æquo dediti, Rheumatismus

tismus Diætâ simplici admodum refrigerante, & mediocriter nutriente, æq; foeliciter, ac repetitis Venæsectionibus (quas minus ferre queant) profligari potest. Ex. grat.

Solo Lactis sero ad dies quatuor vescatur æger, postea præter serum pane similagineo semel in die loco prandii, donec penitus convalescat; nisi quòd postremis diebus iterum panem in cœnam indulgere liceat. Symptomatis cessantibus, carnes pullorum elixorum, cæteraq; eupepta concedantur, tertio autem quoq; die solo lactis sero victi-
ter, donec tandem pancreaticè valeat.

De febre erysipelatoſa.

Nulla non corporis pars, præsertim facies, tumet, dolet & summè rubet, pustulæ densæ, parvæ, in vesiculas subinde facessunt, quæ per frontem caputq; serpunt, oculi tumore obruti, rigor & horror atq; reliqua febris indicia adsunt. In alia hujus morbi specie, liquorum attenuantium potationi superveniente febricula adest, pustulæ urticarum puncturas referentes, nonnunquam in vesiculas sublatae, mox recedentes, tuberculorum more sub cute se condentes, maximè pruriunt, & resalpendo rursum apparent. Est & alia eruptionis species, pectus ut plurimum obducens, macula nimirum lata, cuti vix supereminens, porriginosa, cum squammulis flavis

r
o
is
is
t.
m
ar,
i-

es,
fa,
per
ob-
cia
uo-
nte
tu-
ula
nore
, &
a e
obli
oere
avis
ga

qua vi
vanesce
& flav
ferinus.
eupepti

Mitt

Die se
garivan

R R

Sambuc
mitat.

sem. L

liij. C

ulis li

panno

pressæ,

ars aff

inatur.

R S

alv. p

nixtura

arti a

Si p

am rep

lias vi

no.

Dieb

de cu

Fula

qua vigente, æger bene se habet, eîdem evanefcente, leviter ægrotat, urina turbida & flava, iisdem remediis, quibus pruritus ferinus, cedit, vino utatur æger & carnibus eupeptis.

Mittatur sanguis è brachio ad ζ .x. vel. x. Die sequenti sumat *portionem communem purgativam.*

℞ Rad. Altheæ & Lilior. an. ζ j. fol. Malv. Sambuc. Verbasc. flor. Chamemel. Melilot. summat. Hyperic. & centaur. minor. an. M. j. sem. Linî, fœnugræc. an. ζ ß. coq. f. q. aq. ad liij . Coletur liquor, & tempore usûs adde singulis libris decocti Sp. Vini ζ j. Stuphæ è panno laneo huic decocto immersæ, ac expressæ, calidè admoveantur bis in die, & pars affecta post fotum sequenti mixturâ illuminatur.

℞ Sp. Vini ℥ ß. Theriac. Androm. ζ ij. Malv. piperis longi, & Caryophyll. an. ζ ij. f. mixtura, quâ Charta Emporetica madefacta parti affectæ circumvolvatur.

Si primæ venæsectioni non cedat morbus, tum repetatur; & nondum cessante, ad duas alias vices celebretur, interposito semper die uno.

Diebus à Venæsectione liberis Enema è ste cum Syr. Violarum, Emulsio refrigerans & Julap. refrigerans, sunt præscribenda.

De

De pruritu ferino, & inveteratis cutis eruptionibus, quæ Venæsectioni & Catharfi non cedunt.

℞ Theriac. Andromach. ʒß. Elect. de or
 ðj. rad. Serpentar. Virgin. subtiliff. pulver. gr.
 xv. Lapid. Bezoar. oriental. gr. v. cum s. q.
 Syr. & conditur. citri f. Bolus, horâ somni
 fumendus per dies xxj. superbibendo cochle
 vj. sequent. Julapii.

℞ Aq. Card. Benedict. ʒvj. aq. Epidem. &
 Theriacal. stillat. an. ʒj. Syrup. Caryophyll. ʒj.
 M. f. Julap.

Singulis matutinis cap. liquoris possetic
 ʒß. calidè, & sudet horæ unius spatio.

His finitis, si pustulæ adhuc non evanue
 rint, sequenti Linimento partes affectæ inun
 gantur.

℞ Unguent. ex Oxylapatho ʒj. Unguent.
 Pomati ʒj. flor. Sulphur. ʒiij. ol. Rhodii ʒj.
 f. Linimentum.

Veruntamen Medicamenta præscripta
 haud usurpentur, nisi Venæsectione & Ca
 tharfi ritè præmissis.

De Angina.

Angina inter Ver & Æstatem ut plurimum
 aggreditur. Sequuntur febris insultum do
 lor & faucium inflammatio, unde à tumor
 uvulæ

et

on

8

9

nn

chl

8

8

etio

nue

nun

uere

de

ript

Ca

mun

do

mon

avul

uvulæ,
queat
Mit
gantur
Vitrioli
permix
risma
sed ita
neatur
repetat

R
nar. an
redact.
Gargat
Em
indies
Seq
deglut
tatur,
liās C
Ma
rum)
tharxis
plicetu
Omni
Enema
Diatā
aliquo

uvulæ, tonsillarum & laryngis, nec deglutire queat Æger, nec spiritum ducere.

Mittatur Sanguis è Brachio copiosè. Tangantur partes inflammatae melle Rosaceo, Sp. Vitrioli, vel Sp. Sulphuris ad summum acorem permixto, vel Sp. Vitrioli solo. Mox Gargarisma sequens usurpetur, non vulgari modo; sed ita ut sine ulla agitatione in ore contineatur, donec incalescat; dein expuatur, & repetatur subinde.

R. Aq. Plantag. Rf. Rubr. & Sperm. Ranar. an. ℥iv. album. ovor. in aquam agitando redact. N° iij. Sacchar. Crystal. ℥iij. M. f. Gargarisma.

Emulsio Refrigerans in Pleuritide descripta indies fumatur.

Sequenti manè, nisi febris & dolor inter deglutiendum remiserint, Venæsectio repetatur, Catharsi in diem posterum rejecta, alias Catharticum lenitivum exhibeatur.

Manente adhuc affectu (quod oppidò rarum) repetatur adhuc Venæsectio, & Catharsis; Epispasticum amplum ac forte applicetur cervici post primam Venæsectionem. Omni manè, nisi diebus purgationi datis Enema refrigerans & Emolliens injiciatur; Dietâ tenui utatur æger, & lecto per horas aliquot quotidie absistat.

In

In his omnibus Febribus, quas intercurrentes appello, ut etiam in illa, quæ stationaria est, cautè observandum, quòd æger à lecto abstineat magnam diei partem, ut iusculis hordeaceis, avenaceis, ac id genus aliis victitet, & cerevisiam tenuem lupulatam & hydrogalam pro potu ordinario bibat.

De Morbillis.

Infantes plerumq; impetunt. Primo die rigent horréntque, calent & frigent alternatim. Secundo consummatam febrem accersunt. Ægritudo vehemens, sitis, inappetentia, lingua alba (non verò sicca) tussicula, capitis & oculorum gravedo, & somnolentia perperua, acriter premunt, humor è naribus & oculis jugiter stillat (quæ lachrymæ certissimum morbillorum signum.) Huc accedunt sternutatio, tumor palpebrarum pauló ante eruptionem, vomitus, diarrhœa, cum dejectionibus colore viridi in dentientibus præsertim. Symptomata ingravescent ad quartum usq; diem, quo quidem die (nonnunquam quinto) in fronte & facie maculæ parvæ, rubræ, pulicum morsibus persimiles prodeunt, quæ numero & magnitudine auctæ racematim coalescunt, & faciem maculis rubris majusculis interstinguunt: Hæ maculæ è parvulis papulis, supra cutim paululum elevatis conflantur, quarum protuberantia

t.
o.
à
f-
is
&

lie
a-
er-
n-
la,
tia
&
ri-
int
ne
je-
æ-
ar-
un-
ar-
les
ine
na-
Hæ
au-
be-
ntia

antia d
bendi po
A fac
pectus
propaga
bus lata
perantes
rum no
ac in va
lus; se
cultate
nolenti
fexto a
emorien
reliquo
maxim
facie ex
perman
faciem
pus in
cessunt
ficultas
calido
grescu

R
Cap. V
vel. iv

R
Cap.

antia digito levi, vix oculorum acie deprehendi possit.

A facie, quam primò solùm occupant, ad pectus ventremque, crura deinde tibiasque propagantur maculæ; in his autem partibus latæ & rubræ, superficiem cutis non superantes conspiciuntur. Eruptione morbillorum non perinde deliniuntur Symptomata ac in variolis. Vomitus post eruptionem nullus; sed tussicula & febris cum spirandi difficultate intenduntur, in oculos defluxio, somnolentia & inappetentia perseverant. Die sexto aut circiter frons & facies asperescunt, memorientibus pustulis, ruptâq; cuticulâ, in reliquo corpore maculæ latissimæ sunt, & maximè rubescunt. Octavo circiter die in facie evanescent, & vix in reliquo corpore permanent. Nono nullæ prorsus sunt; per faciem verò & artus quandoq; & totum corpus in farinam quandam & squammulas faecesunt, & tunc temporis febris, spirandi difficultas & tussicula augentur. In adultis à calido regimine livescunt primò, mox nigrescunt exanthemata.

℞ *Decoct. Pectoral. Itis. Syrup. Violac. & Cap. Ven. an. ℥i℥. M. f. Apozema*; *Cap. ℥iij. vel. iv. ter vel quater in die.*

℞ *Ol. Amygd. dulc. ℥ij. Syr. Violar. & Cap. ven. an. ℥j. Sacchar. Cand. albiss. q. s.*
M.

M. f. Eclegma, de quo sæpius lambat, præcipuè quando tussis urget.

Rx *Aq. Cerasor. nigr. ℥iij. Syr. de Mecon. ℥j. M. f. haustus* singulis noctibus fumentus, à primo morbi insultu, usq; dum convalescerit æger, dosin augendo vel imminuendo pro ratione ætatis.

Æger se contineat in lecto per biduum post primam eruptionem.

Si post Morbillorum discessum, Febris, respirandi difficultas, & alia Symptomata Peripneumoniam mentientia supervenerint, sanguis liberaliter extrahendus è brachio semel, bis, vel ter, prout opus fuerit, convenienti spatio interposito inter singulas Venæsectiones; Atq; etiam continentur decoctum Pectorale supra descriptum, ut & *Loboch.* vel *Ol. Amygd. dulc. per se.* Circa diem *xij.* ab invasione Cathartico lenienti purgetur.

Diarrhœa, quæ morbillos excipit, Venæsectione sanatur.

De Variolis.

Distinctæ sunt, vel confluentes: & in distinctis invadunt rigor & horror, calor intensus, capitis & dorsî dolor vehemens, vomitio, in adultis ingens in sudores propensio (& hinc minime confluxuras esse licet conjicere) dolor sub scrobiculo cordis si

o
n
s,
a
t,
o.
r-
as
un
&
ca
nti
re-

li-
en-
vi-
en-
cer
fi
anu

anu pre
inquam
s praefer
triant
edicere,
m sub v
in conf
s ut pl
uarto in
am fer
nt, quod
ata vel
tem su
m acicu
odunt
s univ
m pusti
stavum
larum
me rem
adunt
s claud
anus,
tea lac
aturati
nt, su
on ablu
flammi
iis co
amase
m, qu

anu prematur, stupor & somnolentia, non-
 inguam & insultus epileptici (in infanti-
 s præsertim) quibus si, dentitione peractâ
 tripiantur, in procinctu esse variolas possis
 edicere, ita ut si fortè insultum epilepti-
 m sub vesperam patiantur, sequenti Auro-
 in conspectum se daturæ sunt variolæ, mi-
 s ut plurimum & rarissimè confluentes.
 quarto inclusivè ab invasione die, nonnun-
 tam seriùs, rarò tamen ante illum erum-
 unt, quo tempore vel minuuntur Sympto-
 ata vel prorsus evanescent. In eruptione
 tem subrubræ primò pustulæ, tenuissima-
 m acicularum puncta æquantes, sparsim se
 odunt per faciem, collum, pectus, & cor-
 s universum; tunc in faucibus dolor, qui
 m pustulis surgentibus augetur. Circiter
 favum à primo insultu diem intervalla pu-
 ularum priùs alba rubere jam incipiunt, in
 morem artolli, & dolore tensivo affici; ex-
 nduntur palpebræ, & ut vesica inflata, ocu-
 s claudunt. Proximæ à facie intumescunt
 anus, digitq; distenduntur; pustulæ faciei
 tea læves & rubræ, jam asperæ (primum
 aturationis indicium & subalbidæ appa-
 nt, succum insuper luteum, colore à favo
 n abludentem evomunt, faciei & manuum
 flammatio jam summa in pustularum inter-
 iis colorem exhibet floridum, & rosarum
 amascenarum æmulum, quem quidem colo-
 m, quo mitiores sunt variolæ, eo magis tum
 pustulæ

pustulæ tum cutis interjecta ad amissim
 primunt: Quæ faciem occupant pustulæ,
 superiores quotidie ac magis flavæ pro matur
 tionis ratione; quæ manus & reliquum co
 pus, minùs asperæ albæq; magis conspicu
 tur indies. Die undecimo faciei tumor
 inflammatio recedunt, pustulæ maturæ
 justam magnitudinem (viz. pisi grandiuscul
 adeptæ exarescunt deciduntque. Decim
 quarto vel quinto pereunt funditus; man
 um autem pustulæ pertinaciores, albæ adh
 & recentes die uno aut altero moras trahunt
 & tandem dirumpuntur; cæteræ autem, fa
 ciei nimirum & corporis desquamantur,
 in facie squammulis hisce furfuraceis succ
 dunt foveæ. Per totum morbi decursu
 alvus vel prorsus constipatur vel rarissim
 dejicit. Maxima eorum pars, qui ex hoc
 morbo pereunt, octavo die in discretis, u
 decimo autem in confluentibus intereunt
 Quippe cùm in discreto hoc genere prom
 ventur sudores tum cardiacis tum regimin
 calidiore, prædicto die facies, quæ turgit
 & per interstitia pustulis interjecta infla
 mari debuerat, è contra flaccida reperit
 & albescens, pustulis nihilo minus rubent
 bus & elevatis, etiam post ægri mortem
 sudor, qui huc usq; manaverat, derepen
 evanescit, æger interim phrenitide corripi
 tur, anxietate, jactatione, ægritudine ve
 hementibus, urinam parcè reddit ac frequen

r
s
u
ul
im
m
ha
un
f
r,
acc
rivi
fin
h
u
unt
om
mit
rgi
flan
erit
oen
tem
pen
orrip
e v
que
u

ter, & t
ad plur
In C
atrocion
do, von
non ita
dissolvi
eruption
alterum
cretis v
rarò ta
magis c
quintur
quod f
in lum
tici, i
um in
prinde
remittu
ad mul
atum a
nu, n
is licè
cente
etabile
mplici
omnem
quàm
ula a
tem r
die oct

ter, & tandem paucissimarum horarum spatio ad plures migrat.

In Confluentibus eadem Symptomata (sed atrociora) febris scilicet, anxietas, ægritudo, vomituro, &c. immanius sæviunt; licet non ita promptè, ac in discretis, in sudores dissolvitur æger. Diarrhœa nonnunquam eruptionem præcedit, & ad diem unum aut alterum post illam protrahitur, quod in discretis vix contingit. Tertio die aut citiùs, rarò tardiùs, erumpunt; & quo citiùs, eo magis confluunt. Quandoq; ad quartum vel quintum diem differtur eruptio ob atrox aliquod symptoma, v. g. acutissimum dolorem in lumbis, nephritici æmulum, in latere pleuritici, in artubus rheumatici, in ventriculo cum ingenti ægritudine & vomitu. Non ita inde, ac in discretis, mox ab eruptione remittunt symptomata, sed & febris & alia ad multos etiam dies post eruptionem pustulatum ægrum discruciant: Nunc erysipelatis ritu, nunc morbillorum erumpunt, eruptionis licet tempore plane distinguantur. Crescente morbo, non in molem aliquam spectabilem attolluntur; sed in facie sibi invicem simplicitæ, tanquam vesicula rubra, vultum omnem contegunt, quem maturius elevant quam discretæ: postmodum ad instar pelli- culæ albæ vultui agglutinatæ cutis superficiem non admodum superant. Præterlapso die octavo, pellicula alba quotidie paulatim
C
magis.

magis exasperatur, colore fusto: Intensus magis est dolor cutis, donec tandem in truculentiori morbo non nisi post diem vicesimum latioribus laminis desquamatur. Hoc interim observatu dignum, quod quanto pustulae maturescentes propius ad colorem subfuscum vergunt, eo deteriores lentius abscedunt; quo magis autem flavescent, eo minus confluxerint, & ocyus se proripiunt. Ubi primum deciderit pellicula, nullâ scabritie vultus afficitur; at verò mox illam excipiunt squamulae furfuraceae, indolis perquam corrosivæ, quæ foveas relinquunt patentiores, & sæpe cicatrices. Quandoque humeri & dorsum cuticulâ denudantur. Morbi periculum à pustularum frequentia & numero in facie solâ, æstimandum. Pustula manuum & pedum majores, & quo altius ab extremitate artuum ascenderis, eo sensim minores & contractiores extant. In adultis salivatio, in infantibus diarrhœa (licet non ita certò) confluentium comes. Ptyalismus nunc cum eruptione se prodit, nunc biduo triduoque præterito, materiam primò tenuem, die undecimo viscidiorē ægerrimè excreat. Siticulosus est æger, voce raucâ, somnolentiâ & stupore ingentibus corripitur, inter bibendum subinde tussit, & potus per nares revertitur. Tunc cessat ut plurimum salivatio, cui nisi faciei intumescencia (quæ licet hoc ipso die pro morbi genio aliquantisper remitti debeat,

o
n
o
a
-
n
is
nt
gi
r-
&
la
ab
m
tis
on
us
uo
m,
at.
tia
en-
er-
cui
pfo
de-
at,

beat, n
rūmve
figiter
petias r
Diarrho
ac pr a
rum sp
domina
matura
veniunt
mala ;
& sub
purex
mitate
fidente
tio mo
Sep
one tr
gitur
pus, r
peccat
Di
in cor
vulga
unde
tas, d
nunq
vicin
per
unde
cet,

beat, non tamen nisi post diem unum alterumve omnino recedere) & manuum jam insigniter incipiens & diutius perdurans suppetias tulerint, ægro pretinus moriendum est. Diarrhœa non ita maturè infantes occupat ac praelissimus adultos. In utraq; variolarum specie febris ab insultu ad eruptionem dominatur, inde dat inducias ad pustularum maturationem, quâ peractâ, desinit. Supervenient à malo regimine symptomata anomala; qualia sunt, pustularum flacciditas & subsidencia, phrenitis, coma, maculæ purpureæ pustulis interspersæ, & in earum summitate maculæ nigre exiguæ in medio subsidentes, sanguinis mictus & sputum sub initio morbi, urinæ suppressio.

Separationis tempus cum febrili ebullitione tribus vel quatuor primis diebus transigitur: Expulsio per reliquum morbi tempus, mediantibus parvis abscessibus, in carne periclitatur.

Dies in quo maximè periclitatur æger, in confluentibus in minimè crudo & maximè vulgari genere, a primo morbi insultu, est undecimus, in cradione adhuc decimus quartus, & in cradissimo decimus septimus; nonnunquam tamen sed rarius, non ante diem vicelimum primum moritur æger. Quinimo per spatium illud omne, quod inter dies undecimum, & decimum septimum interjacet, appetente vespere, molestissimo inquietudinis

erudinis paroxyfmo, quotidie vexatur æger.

Mittatur fanguis quovis ex tribus primis diebus ab invafione ad $\text{ʒ}ix.$ vel $x.$ & poſtea *Vomitorium* exhibeatur ad $\text{ʒ}j.$ vel $\text{ʒ}i\beta.$ *Infuſionis Croci Metallorum.*

His primis diebus diluatur fanguis frequenti potatione Cereviſiæ tenuis lupulatae. Cui Vitrioli Spiritus immiſceatur uſque ad plenam puſtularum eruptionem.

Cum variolæ omnes eruperint (quod ut plurimum eſt ſexto die poſt invaſionem) veſperi propinetur *Syr. de Mecon.* $\text{ʒ}j.$ quæ repetatur dehinc ſingulis noctibus ad diem decimum poſt invaſionem. Eâ nocte, ſi Variolæ è Confluentium genere fuerint, augeatur doſis ad $\text{ʒ}i\beta.$ quæ dein repetatur ad $\text{ʒ}j.$ manè, & ad $\text{ʒ}i\beta.$ ſerò ſingulis noctibus, donec æger convaluerit.

Si *Syr. de Mecon.* minus congruat, ſubſtitui poſſit *Laudan. Liquid. viz. gutt. xviii.* pro $\text{ʒ}j.$ *Syrupi,* & *gut. xxv.* pro $\text{ʒ}i\beta.$ Hoc interim obſervandum, quod ſi paregoricum bis in die exhibitum organiſmum compellere non valeat (quod in variolis inſigniter confluentibus ſub finem earum ſæpe accidit) tum 8^a quaq; horâ exhibendum, vel ſæpius, ſi opus fuerit.

At ſi variolæ interſinctæ fuerint, ſatis erit, ut ſolummodo ſingulis noctibus poſt plenam eruptionem exhibeatur Paregoricum, atq; etiam in minori doſi.

t
-
-
-
e
r
e;
er

i-
ij.
n-
ois
on
us
q;

rit,
am
am

na-

Qua
rint, a
fi Phre
dinato
ac pro
non at
tumult
inter
noscer
quod
ingera

Si c
ager c
ambu

Si
expect
fyring
tur è C
sarum

R
Passul
coq. J
oxyme
Garga

Si e
acre m
nam r
pareg
potest
finem

Qualiscunq; autem generis variolæ fuerint, atq; etiam qualicunq; morbi tempore, si Phrenitis acciderit, omnino oportet ut inordinato spirituum motui frænum injiciatur, ac proinde si prior Paregorici dosi metam non attingat, alia atq; alia assumatur, donec tumultus penitus compescatur, interposito inter singulas doses spatium aliquo; ut pernoscere valeamus, utrum dosi ultima id, quod quærimus, præstiterit, antequam nova ingeratur.

Si omnimoda urinæ suppressio acciderit, æger e lecto eximatur, & aliquantulum obambulet.

Si saliva ob calorem sit adeò viscida, ut expectorari non possit, tum Gargarisma cum syringa sæpe in fauces injiciatur. Componatur è *Cerevisia tenui* vel *aq. bord. cum Melle Rosarum*; vel sequens usurpari poterit.

R. Cort. Ulmi ʒvj. rad. Glycyrrhiz. ʒß. Passul. enucleat. N° xx. res. rub. p. ij. coq. s. q. aq. ad thiss. in Colatur. dissolv. oxymel. simp. ʒ mell. Rosar. an. ʒij. M. f. Gargarisma.

Si epispastico opus fuerit, amplum satis & acre nuchæ applicetur nocte istâ, quæ magnam morbi crisin præcedit, mox ab assumpto paregorico; plantis quoq; pedum applicari potest allium, à die octavo, usque ad morbi finem, singulis diebus renovandum.

Si Infans de Symptomatis, dentitionem comitantibus, jam securus, derepente spasmus corripitur, hic cogitandum est convulsionem istam, fortassis à naturæ conatu, quæ variolas, scarlatinam Febrem, aut morbillos, in corporis habitum protrudere satagit, pendere; applicetur itaq; Emplastr. Epispasticum nuchæ. lecto quamprimum committaturager exhibetur insuper cardiacum, cui parégorici auxillum est admiscendum, puero nempe trienni *Laud. Liquid. gut. v. in aq. Epidem. cochl. j.*

Si die undecimo, vel alio quovis post eum, febris secundaria cum inquietudine, jactatione, & cæteris id genus symptomatis, usq; adeò effratur, ut Pægoricis utcuq; repetitis sufflaminari nequeat, & mors quasi immincat, tunc sanguis ad satis magnam quantitatem illicò detrahatur, nempe ad ℥vi . vel circiter, atq; porro repeti possit semel vel bis insequentibus diebus, si symptomatum dictorum ratio idem postulârit; at non aliàs. Catharsis etiam blanda die decimo tertio (non antea) vel quovis alio die eum insequente (modo Venæsectio præcesserit) institui possit, nempe ex *Electuarii Lenitio. ℥j. dissolut. in aq. Cichor. vel. lactis Alexeter. ℥iv.* Veruntamen nec Venæsectio nec Catharsis impediunt, quo minùs Pægorica in usum veniant, quæ, (haud obstantibus iis) tam quoad largam dosin quàm reperitam exhiberi

-
 e
 -
 r,
 -
 t.
 ni
 ro
 t
 m,
 ta-
 q;
 ce-
 m-
 an-
 cij.
 nel
 na-
 gon
 mo
 um
 rit)
 itia.
 eter.
 Ca-
 in
 iis)
 ram
 beri

exhib
ad h
dum.

Q
unga
ol. A
non u

Di
è br
bran
vices

Q
sextu
se co
tectr

Ju
Cere
diem
die o

Si
scrip
buc.
lot. i

Si
labo
pulv
toë
sym
ter e
liibe

exhiberi debent, si opus adhuc fuerit: nam ad hæc in hoc morbo semper confugiendum.

Quando Pustulæ perfectè exaruerint, inungatur facies Linimento ex æqualib. partib. *ol. Amygd. dulc. & Pomat.* per biduum; at non ultra.

Die *xvj.* post invasionem mittatur sanguis è brachio; & sequenti die Catharsis celebranda, quæ porro alternis diebus ad tres alias vices repetatur.

Quoad Regimen; è lecto abstineat ad sextum diem post invasionem, in quo postea se contineat usq; ad *xvij.* non aliis stragulis lectus, quam quibus sanus uti solebat.

Jusculis avenac. hordeac. Pomis coct. & Cerevisiâ tenui victitet, & post undecimum diem vini Hispanic. *Cochl. iv. vel. v.* bis in die exhibeantur, si æger voluerit.

Si crurum tumor non evacuationibus præscript. cedat, tum fotu fol. *Malv. verbasc. Sambuc. Lauri,* cum floribus *Chamæmel & Melilot.* in lacte coct. faciliè fugatur.

Si primis morbi diebus æger Hæmoptoë laboret, vel urinam reddat sanguineam, tum pulvis & tinctura, quæ in capite de Hæmoptoë præscribuntur, sextâ quâq; horâ (donec symptomata ista prorsus cessaverint) diligenter exhibeantur. Quo etiam casu Paregorica liberali manu propinanda.

De chorea Sancti Viti.

Convulsionis species quædam est, pueros puellasve à decimo ætatis anno ad pubertatem invadit, prodit se claudicatione, vel instabilitate alterutrius cruris, quod æger post se trahit fatuorum more; manum ejusdem lateris, vel pectori vel alii alicui parti applicitam, nequit continere in eodem situ horæ momento, sed in alium situm & locum convulsione distorquetur, quicquid æger contra nitatur. Antequam poculum ad os possit adducere, mille gesticulationes, circulatorum instar, exhibebit: Non enim rectâ lineâ ori admovet, sed deductâ à spasmo manu, huc illuc aliquandiu versat, donec tandem fortè fortunâ labris propius apponens liquorem derepentè in os injicit, & avidè haurit; deditâ tanquam operâ, ut spectantibus risum moveret.

Sanguis ad ℥viij. plus minus, pro ætate, ex brachio educatur.

Die sequenti, dimidia pars, vel quiddam amplius, pro ratione ætatis, potionis commun. hauriatur; & vesperi haustulus sequens propinetur.

Rx Aq. Cerasor. nigr. ℥j. aq. Epilept. Langii ℥iij. Theriac. Andromach. ℥j. Landan. Liquid. gut. viij. f. haustus.

os
i-
i-
ft
m
ci-
re
n-
n-
of-
a-
ti
a-
n-
ns
de
ri-
ex
am
m-
ens

gi
id.

ti

Potio

bus, re
noctibu

Poste

Cathari

sanguis

tertiam

ter alte

periculi

Dieb

scriban

R & Ca

tior. an.

vet. &

condit.

capiat

horâ q

sequen

R & R

Angeli

Marru

Baccar

Incidan

rini t

pore.

R & 4

comp.

Potio Cathartic. ad tres vices, alternis diebus, repetatur ; & *haustus Purgatorius* iisdem noctibus.

Postea Sanguis iterum extrahatur ; & ad Catharsin, uti prius, æger revertatur, & sic sanguis mittatur, & alvus subducatur ad tertiam quartamve vicem ; spatio tamen inter alternas evacuationes observato, ut nihil periculi ægro immineat.

Diebus à purgatione vacuis sequentia præscribantur.

℞ *Conserv. Alsinth. Roman. & flaved. Aurantior. an. ℥j. Conserv. Anthos ℥ss. Theriac. Andromach. oct. & nuc. moschat. condit. an. ℥iij. Zinzib. condit. ℥j. Syr. è succ. citr. q. s. f. f. Electuar. de quo capiat ad magnitud. nuc. moschat. manè & horâ quintâ pomeridianâ, superbibend. vini sequentis Cochlear. v.*

℞ *Rad. Pæoniæ, Enul. Campan. Imperator. & Angelic. an. ℥j. fol. Rut. Salv. Betonic. Chamædr. Marrub. alb. & summitat. Centaur. min. an. Mj. Baccar. Juniper. ℥vj. Cortic. duor. Aurantior. Incidantur & infundantur frigide in vini Canariini lbvj. Coletur tantummodo usûs tempore.*

℞ *Aq. Rut. ℥iv. aq. Epilept. Lang. & Bryon. comp. an. ℥j. Syr. Pæon. ℥vj. M. f. Fulap.*
C s cap.

cap. Cochil. iv. singulis noctibus cubitum iturus, insillando *Sp. C. C. gut. viij.*

Applicetur plantis pedum Emplast. d. Caranna

Ob Recidivæ metum pertundatur ei vena & ad dies aliquot purgetur, eâ ipsâ anni sequentis tempestate (vel paulo ante) quâ morbus invasit.

Verisimile mihi videtur, quod hæc methodus curationi Epilepsiæ Adultorum convenire possit, quod tamen non adhuc expertus sum. Cum verò Chorea *Viti* ætates teneras adoriri soleat, in Epilepsia Adultorum tam sanguinis detrahendi quantitas, quàm Catharticorum dosis adaugeantur.

De Apoplexia.

Somnus est profundissimus, & omnimoda sensûs & motûs privatio, exceptâ respiratione, quam ægri habent difficilem cum stertore.

Mittatur Sanguis d. brachio ad $\text{℥}xij.$ quamprimum, ac postea ex venis juglaribus ad $\text{℥}viij.$ deinde *V. miterium* ex $\text{℥}ss.$ vel $\text{℥}ij.$ *Infus. Crac. Metal.* propinetur statim.


Emplast. Epispastic. satis amplum ac forte cervici applicetur.

Dum hæc aguntur, erectus sedeat æger in lecto, nec stragulis nimis obrutus.

Sp. Sal. Armoniac. optimè rectificatus admoveatur naribus.

Finitâ





Finis
hibeant
pii.

Rx A
pilept.
Crystal.

Vel
se propi
roxylin
fita.

Cave
lida, ac
hibeant
virtute
emolun
mores
apta n
non m
gestior

Paro
recidiv

Rx M
die per
miend

Rx
Confero
condit.
Andro
dulo.

Finitâ Vomitorii Operatione, subinde exhibeantur Cochl. iij. vel iv. sequentis Julapii.

Rx Aq. Rutæ ℥iv. aq. Bryon compos. ℥ Antiepilept. Lang. an. ℥j. Sp. C. C. gut. xx. Sacchar. Crystal. q. s. f. Julap.

Vel Cochleare j. Sp. Lavendulæ compos. per se propinari possit bis vel ter, durante paroxysmo, horâ dimidiâ vel integrâ interpositâ.

Cavendum est, ne Cardiaca plus justo calida, ac nimis frequenter (uti mos est) exhibeantur ; nam quacunq; demum specificâ virtute pollere videantur, plus damni quam emolumenti ægro apportant, utpote quæ humores fundere (ac proinde malum augere) apta nata sunt : quod etiam incommodum non minùs infertur ex nimia stragulorum congestione.

Paroxysmo jam finito, ad præcavendam recidivam sequentia exhibeantur.

Rx Pil. Coch. maj. ℥ij. cap. tertiâ quâq; die per 6 vices horâ 4^a matutinâ, superdormiendo.

Rx Conserv. flor. salv. Rorismarin. an. ℥j. Conserv. flaved. Aurant. ℥vj. nuc. moschat. condit. ℥ Zinzib. condit. an. ℥ss. Theriac. Androm. vet. ℥ij. pulv. elect. diamb. diamosch. duls. an. ℥j. cum s. q. Syr. conditur. citr. f. opiata.

opiata, capiat ad magnitudinem *Castaneæ* manè & serò, superbibend. *aq. Epilept. Lang. Coch. ij.*

Rx Ambr. grif. ʒß. ol. destil. sem. Anisi, cinnamom. nuc. moschat. an. gutt. ij. ol. Caryophyl. gut. j. Sacchar. in aq. flor. aurantior. solut. ʒiv. f. s. a. Tabellæ, quarum capiat unam ad libitum.

Ab usu potûs generosioris cuiusvis sibi temperet, vescatur jusculis avenaceis, hordeaceis, ut et ex pullis gallinaceis confectis, & quandoq; etiam (præcipuè inter purgandum) carne pullorum, agnorum ac id genus ciborum euceptum.

De Ophthalmia.

Ex oculorum inflammatione patet.

Mittatur Sanguis è brachio ad ʒx. Sequenti die sumat potionem purgativam communem, quæ repetenda est per duas alias vires, duobus diebus interpositis; iisdem noctibus sumat haustum paregoricum ex *Syr. de Mecon ʒj.*

Diebus à purgatione vacuis sumat ter aut quater in die ʒiv. Emulsionis ex *sem. frigid. maj. & Papav. alb.*

Rx Aq. Plantag. Ros. rubr. & Spermat. Ranar. an. ʒj. pulv. Tutie preparat. ʒj. f. Collyrium, cujus guttæ aliquot instillentur oculis
bis

e
r.

h,
r.
t.
d

n-
a-
&
n)
o-

e-
n-
vi-
io-
de

ut
aj.

at.
ol-
lis
bis

bis in d
mam p

Si h

tatur V

sanguis

tharfis

Abst

genero

lium,

gatione

Not

ctioni

mia no

Mecon.

onem

Ex

ibij. fa

5. ros. i

rubr. i

nis lan

duabu

post

evanu

Ad

urina

cretio

rantis

bis in die; at non incipendum, nisi post primam purgationem.

Si his remediis affectus haud cedat, repetatur Venæsectio semel vel bis (præcipue si sanguis Pleuriticus apparuerit) ut etiam Catharsis.

Abstineat ab usu vini & cujusvis liquoris generosi, ab usu etiam ciborum coctu difficultum, & sale conditorum; & diebus inter purgationes bibat hydrogalam coctam.

Nota, quod sæpe accidit, quòd Venæsectioni & Catharsi utcunq; repetitis Ophthalmia non cedit; hoc in casu *Paregoric. ex Syr. de Mecon. ℥j.* singulis noctibus exhibitum, curationem sine aliorum suppetiis absolvit.

De Uteri Procidentia.

Rx Cort. Querc. ℥ij. Coq. in Aq. font. lbiv. ad lbij. sub finem addendo Cortic. Granator. contus. ℥. ros. rubr. flor. Granator. an. Mij. dein adde vini rubr. itss. Colatura sit pro fotu, quicum panis laneis parti affectæ admoveatur manè horis duabus, antequam è lecto assurgat, & nocte post decubitum, donec symptoma penitus evanuerit.

De Paroxysmo Nephritico.

Adfunt dolor fixus in lumborum regione, urina cruenta, arenularum aut calculi excretio, stupor cruris è directo renis laborantis, testis retractio ejus lateris, in quo
est

est dolor, nausea & vomitus. Dolor colicus nephritico haud absimilis; licet in quibusdam symptomatis planè discrepet, quæ recensita in *Capite de Colica biliosa* videas.

Si Æger temperamento sanguineo fuerit, mittatur sanguis e brachio affecto reni respondententi ad ʒx. dein liquoris posseticici cui *Rad. Althææ ʒij. incoctæ fuerint Cong. j.* quam citissimè deglutiatur; & Enema sequens injiciatur.

Rx Rad. Althææ & Lilior. an. ʒi. fol. Malv. Parietar. Branc. Ursin. & flor. Chamemel. an. M. j. Sem. Lini & Fenugr. an. ʒss. coq. s. q. aq. ad lbiss. M. F. Enema. Rejectis Vomitorio & Enemate, *Laudani Liquidi* satū magna dosis propinetur, viz. ad gutt. xxx. vel *Pill. Matth. gr. xv. vel xvj.* In senibus verò, & morbo diuturno fractis, ut & vetulis Vaporibus obnoxiiis (præcipuè si sub initium Paroxysmi urinam eæ reddant nigram & sabulosam) Venæsectio omittatur; at quoad reliqua, eadem quæ dicta est viâ omnino procedendum.

In mictu Sanguineo à calculo renibus impaeto.

Capiat æger, statò quodam die, singulis hebdomadis, *Mannæ ʒiiss.* in feri lactis lbij. solut.

Conducit aliquando, haustus cerevisiæ tenuis liberalior.

s
n
a

t,
e-
ui
m
n-

ve.
m-

q-
ni-
tn

rv.
ous

ru-
ni-

a &
bad
ro-

to.

ulis
thij.

ifir

In

In c

& obtu
lerabili
ticus co

Aqu
mittet,

jorem
possit i

certò p

paroxy

perpest

renum

pagato,

habeat,

culum

exiguos

indè in

num i

culo in

beat, i

quam

calcu

ico fu

us, qu

ant aq

D

Rige

rpor

min

sa o

In calculo renum grandiori, dolor hebes, & obtusus, nullatenus auctus, sed fatis tolerabilis persentitur, nec paroxysmus nephriticus comitatur.

Aquis chalybeatis æger se non tutò committet, nisi prius certò sciat, calculum majorem non esse, quam ut per ureteres viam possit invenire, quod, hoc tantum modo, certò potest dignosci, si nempe, jam antea, paroxysmum aliquem nephriticum fuerit perpeffus, (cum dolore scilicet sævissimo in renum alterutro, per ureterem ductus propagato, & vomitu enormi) pro comperto habeat, non tam grandiore aliquem calculum pelvi concludi, quam lapillorum exiguorum congeriem, quorum unus subinde in ureterem illabitur, atque ita paroxysmum invitat, qui fere non desinit, nisi calculo in vesicam detruso; cum sic se res habeat, nullum est magis efficax remedium, quam aquarum chalybeatarum potatio: quod si calculosus, nullo unquam paroxysmo nephritico fuerit tentatus, cum jam major sit calculus, quam qui ex pelvi possit elabi, devitandæ sunt aquæ ferreæ.

De Dysenteria, Diarrhœa & Tenesmo.

Rigent horrentque, sequitur deinde totius corporis calor, quem brevi excipiunt ventris tumina, & hæc, dejectiones crebræ, & muco-
sæ omnes (nisi quòd stercorosæ nonnunquam

quam interponantur) cum ingenti cruciatu & molestissimo viscerum omnium quasi descensu, quoties exoneratur alvus, sanguinis interim lineamentis intertextæ, licet aliquando ne minimum sanguinis per totum morbi decursum admisceatur. Progressu morbi sanguis sincerus quandoque excernitur, & gangrænâ insanabili afficiuntur intestina. Si æger ætate floreat, vel cardiacis incalcescat, febricitat admodum, lingua est subalbida, quadam mucilagine densè obfita, interdum nigra & sicca. Prosteruntur vires, dissipantur spiritus, aphthæ insuper oris interna faucesque obsident, præsertim ubi materiz peccantis evacuatio adstringentibus præposcere impeditur, non exacto per cathartica morbi finire. Aliquando, exulante febre, agmen ducunt tormina, & cætera morbi symptomata sequuntur.

In diarrhœa humores excrementitii sine sanguine aut intestinorum exulceratione excernuntur.

In tenesmo assidua est desidendi cupiditas nihil tamen præter mucosum quoddam & subcruentum aut purulentum rejicitur.

Mittatur sanguis e brachio quamprimum eademque nocte *Paregoricum* propinetur; & mane sequenti *Potio purgans communis*, repetenda alternis diebus ad duas alias vices, & *Paregoric.* post Purgationes, quam primum si defunctæ sunt munere; ac diebus à purgatione

i
i
t
i
i
t,
a,
n
i-
na
iz
os-
ica
re,
ny-
fine
ex-
itas
sub-
num
; &
repe
es, &
m su
urga
tion

zione vac
dum.

Post
celebrata
quens Ca

Rx Aq.
Epidem.
Margari
adde Aq.
rem, in
in langu
Potus
Decoct. 2

Rx C.
Aq. f.
biff.
ostulav
B sim
r.

Cum
ta cu
petiti
ct. va
de in
ire co
Cum
furgat
nissis,
atur.

ione vacuis idem mane & serò est exhibendum.

Post Venæsectionem & Catharsin semel celebratam, per totum morbi decursum, sequens Cardiacum exhibeatur.

Rx *Aq. Ceras. nigr. ℥ fragor. an. ℥iij. Aq. Epidem. Scord. comp. ℥ Cinam. bordear. an. ℥i. Margarit. preparat. ℥i℥. Sacchar. crystal. q. s. adde Aq. Rosar. Damascen. ℥℥. ad gratum saporem, m. f. Fulap. de quo cap. cochl. iv. vel v. in languoribus, vel ad libitum.*

Potus sit Lac coctum cum *Aq. Triplo*, vel *Decoct. Alb* ut,

Rx *C. C. C. ℥ mic. panis alb. an. ℥ij. coqu. q. Aq. font. lbij, ad lbj. postea f. q. Sacchar. lbiss. edulcoretur. Vel si dejectio virium postulaverit, Aq. font. lbij. cum Vin. Canarin. ℥ simul coctæ, pro potu frigide assuman-*
r.

Cum per tres vices purgatus fuerit æger, ista curatio usui *Laudani* bis vel ter in die petiti postea incumbit, nisi quòd *Enema ex lact. vaccin. lb℥. ℥ Theriac. Androm. ℥i℥. sub-*
de injiciatur, quod in alvi egestionibus
ire confert.

Cum alvi fluxus in *Diarrhœam* tantum surgat, *Phlebotom. & Catharsi præscript.*
missis, sequ. Bolus singulis matutinis exhibetur.

Rx

Rhabarb. pulv. ʒʒ. (plus minus pro ratione virium) cum f. q. Diascordii f. Bolus, addendo Ol. Chym. cinnam. gutt. ij.

Noctibus insequentibus Paregoric. ex cinnam. hord. at ʒi. ℞ Laudan. Liquid. gutt. xiv. exhibeatur.

Ubi tormina sicca sine dejectionibus cruciant, curantur diluendo sero lactis frigidi propinato, & tepide injecto; ut in Cholera morbo, pullorum jussulo aut lacte cerevisiato.

Si hic morbus diutius excurrat, adeo omnis ejus vis in rectum intestinum decurbar, cum assidua desidendi cupiditate, Diæta Analeptica instituatur, & liquor aliquis Cardiacus pro libitu ingeratur, ut restant possint vires, quibus redeuntibus, Tenesmus sponte se proripit.

In dysenteria male curata dolores aliquando ægrum ad annos aliquot discruciant, in tali casu Phlebotomia repetita pristinam sanitatem restituet.

Notandum est, quod in constitutionibus huic morbo minus faventibus. omissis evacuationibus dysenteria Laudano solo sanatur, quod manè & serò repetendum, donec symptomata penitus evanuerint, vel etiam ter Nycthemero spatio, si opus fuerit.

er
id
la
ev
o
er
D
iq
un
efm
qua
in
tar
oni
a cu
, qu
tom
her

Intest
horas ali
Refinens,
ur in pe
orat ; f
ub ini
unctum
nitureti
icorum
er dolo
omitur
rictio,
A neph
ritico
porri
Colicus
m ve
ugetur
olico c
omitu
ritico
num c
tand
colic
Sang
r, & p
r. Po
rposit
etur.

De Colicabiliosa.

Intestinorum dolor atrocissimus est, per horas aliquot affligit febris in hunc morbum desinens, qui aut quasi injecta fasciâ constringitur in punctum contractus quasi terebello perforat; subinde remittitur, mox recrudescit. Sub initio non ita certò ad unum aliquod punctum determinatur, neq; tam crebra vomituritio, neq; alvus ita pertinaciter cathartorum vim eludit; quo autem magis augeatur dolor, eo obstinatius in puncto figitur, vomituritio frequentior & major alvi adstrictio, colicâ tandem in iliacam transcente. A nephritide sic distinguitur. 1. Dolor nephriticus fixus in rene est, & ab eo ad testem porrigitur secundum longitudinem ureteris. Colicus vero vagus est, & cinguli instar mediam ventrem affligit. 2. A pastu colicus dolor augeatur: Nephriticus potius imminuitur. 3. In colico dolore, ab excretionem per alvum & per vomitum majus levamen emergit, quàm in nephritico. 4. In dolore nephritico urina primum clara & tenuis, postea aliquid subsidet, tandem arenulæ aut lapilli excernuntur: Colica urinæ ab initio crassiores existunt.

Sanguis è brachio paulò liberaliùs educatur, & post horas *iiij.* vel *iv.* *Anodyn.* exhibeatur. Postero die *Catharticum Lenitiv.* & in proposito die uno, ad tertiam vicem propinetur.

At

At si malum hoc fructibus horariis, vel aliis cibis avidè ingestis, originem debeatur, ventriculus ante omnia lacte cerevisiarum affatim hausto eluendus est; quo exantlatum Anodynum propinandum est; sequenti autem die vena secanda est, & in ordine præscripto procedendum.

Ubi hic morbus minùs peritè tractatus, & utissimè fatigaverit, & ægrum penè confecerit, liberalior sive aquæ Epidem. sive Mirab. sive aliùs cujuscunque, qua sanus maximè delectabatur, usus, ægrum hoc tempore ultro spem omnem juvit.

De cholera Morbo.

Intra Augusti limites se continens, vix priores Septembris hebdomadas evagatur. A crapula & ingluvie excitatus similis affectus nullo temporis discrimine insurgit, qui licet eodem curetur modo, alterius tamen est subfellii. Adfunt vomitus enormes, ac pravorum humorum cum maxima difficultate & angustia per alvum dejectio; ventris ac intestinorum dolor vehemens, inflatio & distentio; cardialgia, sitis; pulsus celer & frequens, parvus & inæqualis; æstus & anxietas, nausea molestissima, sudor, crurum & brachiorum contractura, animi deliquium, partium extremarum frigiditas, & similia, quæ ægrum in 24 horarum spatio intermunt.

ve
ea
fian
lar
ten
ipu

s d
cece
irai
cin
altr

x

ctus

lice

sub

avo

re

c in

c d

r a

c an

urum

iqui

simi

nter

Pa

Pullus
Congiis c
eptribilen
defectu
liquor c
odem t
ccessive
bus Sy
rimue
rit.

Exanth

lio. ho

ni Con

Si non

er vom

contin

cant n

um Li

jori de

cinna

nata, r

etendu

vires

Est spe

us val

ex I

s.

dorum

vent

to m

umor

Pullus tenerior in tribus circiter Aq. font. Congiis elixetur, ut carnis saporem vix perceptibilem liquor referat, hujus decocti vel defectu ejus) liquoris possetici capaciores liquor cyathos æger tepidè exhauriat; & eodem tempore ex eodem liquore *Enemata* successivè repetenda. *Haustibus & Clystibus Syr. Lactuc. Violar. Portulac. Nymph. &c.* alicujus uncia subinde admisceri poterit.

Exantlato hoc Eluvionis penso (quod *iiij.* diebus sibi vendicat) *Paregoricum* curatori Coronidem imponit.

Si non accesserit medicus, nisi postquam per vomitu & dejectionibus per multas horas continuatis fuerit exhaustus, & jam friscant membrorum extrema, tum ad *Laudanum Liquidum* confugiendum est in paulò majori dosi (viz. *Laudan. liquid. gutt. xxv. in cinnam. fort. ʒi.*) & cum cessaverint symptomata, nihilominus manè & serò quotidie est repetendum, at in minori dosi, donec pristina vires receperit.

Est species quædam cholerae morbi infans valdè familiaris, ac sæpenuerò funestissima, ex Dentitione vel Crapula originem ducens.

Infantum ætas tenella minimè fert, ut diluatio ventriculus largâ liquorum potatione, tanto minùs ut Catharticis tumultus major humoribus excitetur, sed Curationem *Laudano*

dano solo aggredi oportet; quamobrem *gutt.* ij, iij, vel iv, vel plures, pro ratione ætatis Cochlear. j. cerevisiæ tenuis vel Aquæ cujusvis appropriatæ instillatæ exhibeantur, repetanturque, ut opus fuerit.

De colica Piclontum.

Est species quædam Colicæ, quæ degenerare solet in Paralyfin, & motus omnimodam manuum ac pedum depravationem; quam hoc nomine *Riverius* in capite de Paralyfi indigitat, & apud insulas Caribum notissimum est; utpote quæ magnam vim hominum infestat.

Hunc dolorem atrocissimum sanat *Balsam. Peruv.* frequenter ac in magna dosi exhibitum nempe si ejus *gutt.* xx, xxx, vel xl. *Sacchar. alb. ss. cochl. j.* instillentur, & bis vel ter indantur: at Paralyfis huic remedio haud cedit.

De iliaca Passione.

Peristalticus intestinorum motus invertitur propinata cathartica & injecta enemata in emetica statim transeunt, alvi fæces per vomitum rejiciuntur.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad 5 vel x. post aliquot horas exhibeatur sequens Pulvis.

℞ *Resin. Scammon. vel (defectu ejus) Resin. Falap. gr. xij. Calomelan. Torquet. ʒi. m.*

Pulvis.

ne
am
am
ly
ura
in

for
tum
cha
nd
ced

titu
em
nitu

id
qua

R
f. m
Pul

ulvis ; ca
bendo e
el si form

R^o P. l.

m f. q.

ochl. j.

Sin au

erit, L

am. fort

um ve

entris c

stium i

orum v

amituri

artico

um par

emque

atâ qu

maino

articu

ti.

Nec f

terâ, p

uem, c

re, f

verso,

alidull

est ali

atus

ulvis ; cap. è Coch. i. lactis vaccini, super-
bendo ejusdem lactis Coch. j. vel alterum :
et si forma Pilularum magis arrideat :

R^o Pil. ex duob. ꝑ℞. Calomel. Torquet. ꝑj.
m f. q. Balsam. Peruv. f. Pil. iv. sumend. e
ochl. j. Syr. Violarum.

Sin autem æger hoc remedium per os re-
terit, Laudan. Liquid. gutt. xxv. Aq. Cin-
am. fort. ꝑ℞. instillatæ statim propinentur ;
cum vero horum usu vomituritio, ac
cæcis dolores, remiserint, catharticum
iterum exhibeatur : verum si anody-
norum virtute ac vi jam penitus infractis
vomiturio ac dolor iterum redierint, ca-
thartico interim in corpore resitante, ad
purgantia pargorici supra descripti revertendum,
semper eò usque repetendum quartâ vel
quâque horâ donec intestinis quies
minimo inducatur, quo quidem tempore ca-
tharticum operationem suam per sedes exe-
cit.

Nec sanè abs re fuerit elapsâ horâ unâ, aut
terâ, post Venæsectionem, clysterem ali-
quem, ex iis qui potentius operantur, inji-
cere, fumum scilicet nicotianæ, ex tubulo
perforato, per vesicam majusculam, in intestina
validissime insufflatum, quæ quidem operatio
post aliquot horas reiterari debet, nisi citius
status deorsum pateat.

Finitâ

Finitâ operatione Cathartici, sumat sequentem haustum.

Rx *Aq. Cinnam. fort.* ℥i. *Laudan. Liquid. gutt.* xxv. m. f. *Haustus*, qui porrò repetendus est bis, ter, vel sæpius in die, donec vomituri-
tio & dolor penitus cessaverint; atq; etiam
istis symptomatis cessantibus, nihilominus ad
curationem confirmandam per aliquot adhuc
noctes capiat idem paregoricum in minori do-
cubitum iturus.

De Fluxu Mensium immodico.

Menstruorum fluxus, naturaliter constitu-
tus, capacitatem testæ ovi anserini implet.
Patet autem immodicus ex difficili tolerantia
virium lapsu, inappetentia, cachexia, colore
cadaveroso, & pedum intumescen-
tia.

Mittatur sanguis e brachio ad ℥viij. sequenti
manè sumatur *potio purgativa communis*, repe-
taturque alternis diebus ad duas alias vices,
& noctibus post purgationem *Paregoric.* è *Syr.*
de Mecon. exhibeatur.

Diebus à purgatione vacuis sumat sequen-
tia.

Rx *Conserv. Rosar. sicc.* ℥ij. *Trichisc. de ter.*
Lemnia ℥iss. *Cort. Granator. Corall. rub. præp.*
rat. ℥ bol. *Armen. an.* ℥j. *lapid. hamat.*
Sanguin. Dracon. an. ℥j. cum s. q. *Syr. Cyd.*
nior. f. Elect. de quo sumat ad magnitudi-
nem

h
-
n.
ad
us
ob

tu-
let
tia
lore

ent
epe
ces
Syn

uen

ter
r. epe
mat
Cyde
itud
nem

nem nu
pomeri
Cochl.

Rx A
Aq. Ci
an. ʒi.
tem.

Rx I
dantur
clarific
usculè
Post
plast. s

Rx I
aq. ex
gioni l

Est
valde
ma, c
scrobi
humor
ejectio
Pri
in ver
Pareg
liquor

nem nucis moschat. maj. manè & horâ quintâ pomeridianâ, superbibendo sequentis Julapii Cochl. *vj.*

R *Aq. Germin. Querc. & Plantag. an. ℥iij. Aq. Cinnamom. bordeat ; & Syr. de Rosis siccat an. ℥i. Sp. Vitriol. q. s. ad gratam aciditatem.*

R *Fol. Plantag. & Urtic. an. q. s. Contundantur simul, & succus exprimatur, & postea clarificetur, de quo cap. Cochl. iv. vel v. sæpiusculè ad libitum.*

Post primam purgationem applicetur emplastrum seq. regioni Lumborum.

R *Emplast. de Minio & ad Herniam an. part. aq. extendantur super alutam, f. Emplastrum regioni Lumborum admovendum.*

De Colica hysterica.

Est species quædam, seu potius insigne ac valdè usitatum affectionis hysterice symptoma, cui comitem se adjungit dolor circa scrobiculum Cordis atrocissimus, uti etiam humorum viridi colore per vomitionem ejectio.

Primo, quòd saburra vitiosorum humorum in ventriculo contentorum minùs impediatur Paregorici efficaciam, satis magna quantitas liquoris possatici assatim ingurgitetur, atque

iterum per vomitionem reiciatur, nempe
ejusdem liquoris Cong. iß, quo peracto Laudan.
Liquid. gutt. xxv. in Aq. cinnam. fort. Aq. Epi-
dem. vel alijs vehiculi ʒi. propinentur.

In usu Paregoric. hoc notandum, quòd
eò usque repetendum est, donec symptomata
omnia penitus cessaverint, debitum interea
tempus interjiciendo; ut dijudicare valea-
mus, quid prior dosis effecit, antequam no-
vam ingeramus.

Si sanguineo temperamento præditus sit
æger, vel si antea hoc symptomate haud mul-
tum infestatus fuerit ac viribus fractus, hoc
in casu sanguis primùm e brachio detrahenda-
us antequam vomitorium præscriptum pro-
pinetur.

Hâc ipsâ Methodo Clavus hystericus cu-
ratur. Sin verò Colica HystERICA diutius
nior fuerit per Paroxysmos affligens: tum
eorum intervallis, sive extra Paroxysmum, seorsum
usurpentur.

℞ Zedoar. subtiliss. pulv. ʒi. cum f. q. S.
è conditur. citri f. Bolus, sumendus manè
serò per xxx. dies, superbibendo sequentem
infusionem.

℞ Zedoar. incis. minutim ʒss. vini Canar. ʒi.
infundantur frigide per xij horas; deinde colemus
pro usu; vel Balsam. Peruv. ut in Colica Pic-
num, usurpetur.

ape
an.
pi

od
ara
rea
lea-
no-

fit
mul-
hoc
hen-
pre-

ce
atur
m
fecu

. S
e
nter

x. 3
len
Pich

Q

Q
de C
ut &
U
détu
dem
qual
mun
C
qua
qui
gas
quer

R
lidon
min
Rhe
Syr.
cap
con

C
ocu
col
cta
ling
sing
nu
bur

Quæ de Colica Hysterica hîc dictuntur, de Colica etiam hypochondriaca dicta sunt; ut & hoc diligenter advertendum.

Utriusque affectûs natura sibi vindicare videtur, ut alia atque alia tententur, donec tandem ad illud remedium perventum fuerit, cui quasi genuinè morbus cedit; tametsi ut plurimum Chalybs imprimis confert.

Colica Hysterica tam in hypochondriacis quam hystericeis sæpissime in Icterus definit, qui sensum sponte suâ facessit, sin autem longas moras nectat, exhibeatur Apozema sequens.

Rx Rad. Rub. Tinctur. curcum. an. ℥i. chelidon. maj. cum toto & summitat. centaur. min. an. M. j. coq. in æqualib. partibus Vin. Rhenani & Aq. fontan. ad lbij. colatur. dissolv. Syr. de 5 radicibus ℥ij. m. f. Apozema, de quo capiat itss. calidè mane & serò, usque dum convaluerit.

De Ictero, colicâ neutiquam prægressâ.

Color flavus in toto corpore, præsertim in oculorum albis est conspicuus, quo quidem colore objecta omnia apparent affectis tincta, corporis pruritus, segnities, & lassitudo, linguæ amaror, vomitus biliosus interdum, singultus, egestio alba, urina crocea & partum immersum eodem colore inficiens, morbum indignant.

Exhibeatur potio purgativa communis, dein aggrediatur usum sequentium; & durante eorundem usu, Catharticum præscriptum quarto quoque die exhibeatur.

Rx Conserv. Absinth. Rom. conserv. flaved. Aurant. an. ℥i. Angelic. condit. nuc. moschat. condit. pulv. Ari compos. & chalyb. cum aceto preparat. an. ℥℔. Extract. centaur. min. Extract. Gentian. & cremor. Tartar. an. ℥ij. croc. Anglie. pulv. ℥℔. cum s. q. Syr. de 5 radicibus f. Electuarium, de quo cap. ad magnitud. nuc. moschat. manè & horâ quinta pomeridianâ (vel vice Electuarii sumat pilulas chalybeatas) superbibendo post matutinam dosin aquarum mineralium purgantium itiv. & post pomeridianam dosin Apozemat. in colica hysterica descript. ℥℔.

At si signa hydropis affuerint, tam manè quàm serò apozema superbibat.

Si vel his diu continuatis morbus adhuc obstiterit, ad aquas ferreas eundum est, quæ ex ipso fonte sunt bibendæ.

Ad præcavendum abortum.

Eadem præscribenda, ac in Fluxu mensium immodico, omittis solummodò catharsi & succis.

De immodico lochiorum fluxu.

Fluxum lochiorum naturalem tria constituant, sanguis scilicet purus, copiosus, per

s
.
-
-
n
st
-
ne
b-
p-
nfi-
i &
on-
per
uri-

tridu
quofu
quatr
postu
pauce
que
ment

Fl
cand
quio
dolo
fu d
rium
V
quer

R
ad
albi
ter i

In
tis
quer
R

succ
R
faci

I
ven

triduum primum fluens; dehinc sanguis aquosus, loturæ carniū crassiori similis, per quatrīdium præterpropter durans; hinc postmodum materia viscosa & mucilaginosa, pauco aut nullo sanguine permista, per quinque aut septem dies prodiens, & sic porro ad mensis finem.

Fluxus autem eorum immodicus dijudicandus est ex viriū dejectione, animi deliquio, sanguine grumoso effluente, cibi fastidio, dolore in hypochondriis, ventristensione, pulsu debili & frequenti, visus obtenebratione, aurium tinnitu, & convulsionibus.

Victus incrassans instituitur, & potus sequens addatur.

Rx Aq. Plantag. vin. rubr. an. ℥ij. coq. simul ad tertias, & deinde edulcoretur ꝑ. q. sacchar. albiss. cujus, cum frigescat, cap. ℥ss. bis vel ter in die.

Interim Julap. aliquod Hystericum (at satis mite) subinde propinetur, & nodulus sequens naribus applicetur.

Rx Galban. Aſæ fetid. an. ʒij. castor. ʒjss. sal. succin. volatil. ʒss. m. f. nodulus, vel

Rx Sp. salis Ammoniac. ʒij. quem saepe olfaciat.

De suppressione Lochiorum.

Intumescit venter, dolor gravativus in unum ventrem, lumbos & inguina occupat, facies

rubescit, difficilis est respiratio, perturbantur oculi, rigores, febres acutæ adfunt, animi deliquia, sudores frigidi, pulsationis & ardoris sensus in utero, paralyfis in partibus inferioribus, ut & interdum epilepsia.

È vestigio lecto addicatur, & *Emplast. hystericum* umbilico admoveatur quamprimum. *Elect. seq.* adhibeatur.

Rx Conseru. Alfinth. Rom. Rut. an. ℥i. Trochisc. è Myrrh. ℥ij. Castor. croc. Anglic. sal. volatil. Sal. Armoniac. & Asæ fetid. an. ℥℔. cum s. q. Syr. è 5 radicib. f. Elect. cap ad magnitud. nuc. moschat. quartâ quâq; horâ, superbibendo seq. Julap. Cochl. 4 vel 5.

Rx Aq. Rutæ ℥iv. Bryon. compos. ℥ij. Sacchar. cend. q. s. f. Julap. vel sumat Trochisc. de Myrrh. ℥j. quartâ quâque horâ.

Si tota prædictorum quantitas consumatur, & Lochia adhuc supprimantur, *Laudanum* unicâ saltem vice exhibendum; ut, *Laudan. Liquid. gutt. xiv. in Aq. Bryon. compos. vel Laudan. solid. gr. i℔. cum Asæ fetid. ℥℔ in pilula duas redactum.*

Si hæc nihil proficiant, tum *Enema ex lacte Saccharato*, unicâ saltem vice, injiciatur.

De Hydrope.

Foveæ à digitorum impressione in surarum parte inferiori sub noctem conspicuæ, manè evanescentes, hoc malum primum indicant, maxime

maxim
(haud
quibus
mate
tumor
extrem
& ad
tim d
bilia
Pro ra
gentu
gentil
intens
nas, r
adori
Inc
ad aq
randu
prove

R
Zinz
f. Pot
singul
rium
vel,
R
Coq.
Man
cervi
fumo

maximè si spiritus interim ægriùs ducatur (haud rarò tamen foeminae prægnantes, & quibus catamena sistuntur, ut & viri ab asthma in veterato derepentè liberati eodem tumore tentantur) pedibus cruribusque ad extremum extensis, in abdomen ruunt aquæ, & ad ultimum capacitatis suæ limen paulatim distendunt, donec tandem in viscera nobiliora impetu ab iis factò æger submergitur. Pro rata qua partes à morbo obsessæ mole augmentur, aliæ magis magisque gracilescent, urgentibus dyspnœâ, urinæ paucitate, & siti intensâ. Viros, ingravescente ætate; foeminas, ubi jam parere desierint, ut plurimum adoritur.

Indicationes curativæ dirigendæ sunt primò ad aquarum evacuationem, deindè ad instaurandum sanguinis robur; quò novus aquarum proventus præcaveri possit.

℞ Vini albi ℥iv. Jalap. subtiliss. pulv. ℥j. Zinzib. pulv. ℥ss. Syr. de Spin. Cervin. ℥i. M. f. Potio, sumenda summo manè, repetendaque singulis vel alternis diebus, pro ratione virium, donec partes affectæ detumuerint; vel,

℞ Tamarind. ℥ss. fol. Senn. ℥ij. Rhei ℥iss. Coq. in s. q. aq. ad ℥iij. in Colatur. dissolv. Mannæ & Syr. Ros. solut. an. ℥i. Syr. de Spin. cervin. ℥ss. Elect. è succ. Rosar. ℥iij. M. f. Potio, sumenda, ut supra; vel,

℞ *Pil. ex duob. ʒj. Elater. gr. iij. Ol. Cbym. Caryophyl. gut. ij. f. Pil. N° iij. cap. summo manè, repetanturque, ut opus fuerit; vel,*

℞ *Gambogii gr. xv. vin. alb. ℥ aq. Cichor. an. ʒss. Syr. de Spin. Cervin. ʒss. m. f. Potio sumenda ut supra; vel,*

℞ *Cortic. interior. Sambuc. è ligno derafi M. iij. coq. in aq. ℥ lact. partibus aq. mistorum lbij. ad lbj. Colaturæ capiat dimidiam partem manè, & alteram serò quotidie, donec convalescat. At hoc remedium, nisi in corporibus, quæ facillimè purgativis cedunt, nihil confert.*

Circa utum Catharticorum in hoc morbo hæc tria advertenda sunt.

Primo, utrùm ægri corpus facilè, an verò difficulter Catharticis cedere soleat,, cùm in iis qui facilè purgantur *Syrup. de Spin. Cervin. solus ad ʒi.* exhibitus aquas sat copiosè eliciat; in illis verò, qui difficulter purgantur, Cathartica supra descripta, utut valida, vix scopum attingant.

Secundò, Cathartica omnia, quæ segnius operantur, agis officiant quam prosunt; quàmobrem purgatio paulò fortior & nimia, iusto debiliori est præferenda.

Tertio, Aquæ eâ maximâ celeritate exhauriri debent quam ægri vires ferre queant: ne nimis longa inter purgationes intervalla adhibendo, aq. denuò affatim colligantur.

fi
-
n
o-
in
t,
oo
vò
in
er-
ose
ur,
vix
ius
m-
nia,
ex-
nr:
ad-
Ea

Est
liscun
prorsu
enim
foemin
cuatio
quæ e
vialib

R & C
in vi
colati
singul
evanu
Aq
& co
ut,
R
absint
Geni
ordin
quan
utatu
R
gi. E
taur.
Elect
nuc.
& ve
onis.

Est autem ubi medicamenta omnia, quæ-
 liscunq; demum generis, quæ alvum movent,
 prorsus omitti possint ac debeant; quoties
 enim æger constitutione est infirmiori, vel
 femina vaporibus obnoxia, aquarum eva-
 cuatio Diureticis solum committenda, inter
 quæ ea sunt efficacissima, quæ ex salibus Lixi-
 vialibus fiunt; ut,

℞ Cinerum Genistæ ℥j. infundantur frigide
 in vini Rhenan. ℔iv. liquoris per filtrationem
 colati ℥iij. manè, quintâ pomeridianâ & sero
 singulis diebus exhibeantur, usq; dum humor
 evanuerit.

Aquis jam penitus evacuatis Calefacientia
 & corroborantia medicamenta usurpanda;
 ut,

℞ Rad. Raphan. Rustican. fol. cochl. hortens.
 absinth. vulgar. Salvo summitat. centaur. min. ℥
 Genistæ, infundantur in cerevisia forti pro potu
 ordinario, qui potus incipienti hydropi ali-
 quando sine Catharticeis subvenit; vel sequent.
 utatur;

℞ Conserv. Cochl. hortens. absinth. Roman. an.
 ℥i. Extract. Gentian. Absinth. vulgar. ℥ Cent-
 aur. min. an. ℥iij. cum s. q. Syr. è cortic. citr. f.
 Electuarium, de quo sumat ad quantitatem
 nuc. moschat. maj. manè, quintâ pomeridianâ,
 & vesperi, superbibend. ℥iv. sequentis infusi-
 onis.



R. Rad. Gentian. ℥i. Summitat. Genist. Centaur. min. ℥ Absinth. vulgar. an. M. j. Sem. fœnicul. ℥ Petroselini an. ℥ij. incis. minutim affunde vini Rhenani lbiv. stent simul in infusione frigida, & coletur. solummodo tempore usûs.

Notandum, cùm ad corroborantium usum deventum fuerit, ægrum nullo modo esse purgandum, tantisper dum sanguinis corroborationi navetur opera.

Quod & per salium Lixivialium usum omnino observandum, quo quidem tempore pariter corroborare convenit.

R. Rad. Raphan. Rustican. ℥ij. fol. Cochl. Hortens. absinth. vulg. salvie, Summitat. Centaur. & Genistæ, an. M. iij. Aurant. incis. N° iij. Infundantur in Congiis vj. Cerevisiæ fortis non lupulata, inter fermentandum ; sit pro potu ordinario.

De Gonorrhœa virulenta.

Corripiunt dolor genitalium insolitus, & rotatio testiculorum, in non recutitis macula morbilli æmula glandem occupat, statim à ejus exortu liquor, seminis instar, exstillat, qui quotidie à seminis colore & consistencia recedens flavescit tandem dilutius ovi vitello ; in lue virulentiore virescit, & aqueo humore permiscetur sanguine tincto. Pustula dicta ulcus fit, aphthis infantum simile, induratus & profundius depascens, superveni-

ente

nist.
l. j.
mi-
in
em-

sum
esse
tro-

om-
pa-

Jov.
. &
In-
non
or-

&
ulh
a à
at,
tia
o;
om
ta
ien
ni-
ne

ente c
solâ
dolor
trans
præci
Curv
ardor
bilis,
acrite
Caru
unt ;
quam

R
3i. R
Opob
cap.
& col
dum
ad se
in se
cessa

In
inter
va, c
Elect
minu
ad g
bus
Mino

ente orificiū callo. Verpi non glandis ulcere solā Gonorrhœā tentantur. Mox magnus dolor in pene, quoties erigitur; quasi manu transversus fortiter constringeretur, noctu præcipuè urget, dum æger lecto incalescit. Curvatur penis à fræno contracto. Accedit ardor urinæ, inter mingendum vix perceptibilis, sed mictu finito, per urethræ ductum acriter urens, maximè quā in glandem desinit. Carunculæ lotii exitum quandoque impediunt; & scroti dolor ac inflammatio nonnunquam superveniunt.

R. Mass. Pil. Coch. maj. ʒiij. Extract. Rud. ʒi. Resin. Falap. & Diagryd. an. ʒß. cum s. q. Opobalsam. f. Pilul. è singulis drachmis vi, cap. iv. singulis Auroris, donec urinæ ardor & color flavus materiæ seminiformis, admodum imminuantur. Postea alternis diebus ad septimanas adhuc duas; ac sub finem bis in septimana, donec humor stillare prorsus cessaverit.

In iis, qui difficulter purgantur, subinde intercalari possit potio communis purgativa, cui addantur, *Syr. è Spin. Cervin. & Elect. Succ. Rosar. an. ʒii. vel, curatione minùs sæliciter succedente Turbith. Minerale ad gr. viij. exhiberi potest bis vel ter, diebus quatuor interpositis, vel vice Turbith. Mineral,*

R Pil. ex duob. ʒss. Merc. dulc. ʒi. cum f. q. Opobalsam. f. Pil. iv. summo mane sumendæ.

Si æger à dicta Catharsi abhorreat, post pilulas primò descriptas, tribus Auroris continuis sumptas, tum manè & horâ quintâ pomeridianâ quotidie injiciatur Clyster sequens, nisi quod semel aut bis in hebdomade, omisso Clystere, Cathartic. imperandum.

R Elect. è succ. Rosar. ʒvi. Terebinth. Venet. Vitello ovi solut. ʒss. dissolvantur in Aq. bord. lbi. Colatur. adde Syrup. Violar. ʒii. M. f. Clyster.

Singulis noctibus cap. *Opobalsam. vel Balsam. è Mech. gutt. xxv. Sacch. frustulo exceptas. Hujus defectu Terebinth. Cypr. ad quantitatem Avellanæ substitui possit.*

Sit pro potu hydrogala ; at Cerevisia tenuis in passibus.

Vel sequentem methodum aggrediatur,

R Pil. ex duob. ʒss. Opobalsam. gutt. iii. f. Pil. N° iii. Cap. horâ quartâ matutinâ, superdormiendo, repetanturq; alternis diebus, vel tertîâ quâque die.

Diebus à purgatione vacuis injiciatur manè & horâ quintâ pomeridianâ Clyster supra descriptus.

Procedente curatione (quâcunq; eâ demum methodo tentetur) sanguis sub medium

cuius-

t
-
-
s,
60

b.
q.
f.

al-
as.
em

uis

Pil.
or-
cer-

anè
de-

de-
ium
uriz-

curatio
frigera
dicam
sunt h
Ec.

Si P

R
Verba
Melilo
coq. s.
move
die.

Per
fecta
è mu
præpu
Si U
Glanc
præfo

R
3ij. p
3ß. A
tur,
præfo
Si
è bra
præfo
fotib

curationis semel vel bis mittatur, & diæta refrigerans & incrassans præscribatur, & medicamenta iisdem virtutibus pollentia, qualia sunt *hydrogala*, *Emulsiones ex seminib. frigid.* &c.

Si Penis Tumore afficiatur,

℞ *Rad. Althææ, Lilior. an. ʒiʒ. fol. Malv. Verbas. Sambuc. Hyoscyam. flor. Chamæmel. Melilot. an. M. j. sem. Lini, Fænugræc. an. ʒʒ. coq. s. q. Aq. font. ℥ f. f. totus parti affectæ admoveendus per horæ unius spatium bis vel ter in die.*

Peractâ fomentatione, perungatur pars affecta ol. sem. Lin. rec. extract. dein *Emplast. è mucilaginis alutæ agninae inductum labiis præputii tumidis circumponatur.*

Si Ulcus in præputii labiis, vel in subjecta Glande, hæreat, tum sequens *Linimentum* præscribatur.

℞ *Unguent. Basilic. ʒvj. Unguent. Nicotian. ʒij. præcipitat. Aq. Rosar. loti ℥ optimè levigat. ʒʒ. M. f. linimentum, quo linteï rasura imbuitur, & ulcusculo admoveatur semper post fortis præscripti usum.*

Si scrotum tumore afficiatur, statim sanguis è brachio extrahatur, atque bis in die fortis præscriptus parti affectæ admoveatur, singul. fortibus addendo *Sp. vin. Gallic. Cochl. j. vel al-*

alterum, vel Cataplasma ex Oxycrato & farina fabarum ejus loco applicandum.

Catharticis interim & refrigerantibus modò descriptis introsumptis utendum est.

De Lue Venerea.

Ubi aut à Gonorrhœæ mora, aut indebito astringentium usu labes sanguini imprimitur, exoritur Lues. Comparent in inguine bubones, in capite dolores & artibus, articulorum interstitiis, noctu præcipuè invadentes in lecto calidos, crustulæ & porrigines in variis corporis partibus, quæ ad instar favi flavescunt. Quo magis scabies diffunditur, tanto minùs æger discrucietur. In cranio, tibiis barchiisq; exostoses, osium inflammatio & caries, ulcera phagædenica in variis partibus, sed fauces ut plurimum primò aggredientia, quæ sensim per palatum in nasi cartilaginem propagata mox eam absumunt, ita ut fulcro destitutus nasus planè concidat. Ulceribus, carie & dolore indies exacerbatis, pereunt per vices membra; lacerum donec cadaver, & jam Superis grave humo condatur.

Rx Axung. Porc. ʒj. Mercur. crud. ʒi. M. f. Linimentum, in tres æquales partes dividendum, quarum unâ brachia, crura & tibiae ad tres noctes continuas manibus suis æger perungat.

Si

na

ld

ito
ur,
co-
um
le-
riis
ef-
no
ois
&
rri-
re-
ar-
unt,
dat.
ba-
um
mo

l. f.
len-
bias
eger
Si

alterum, vel Cataplasma ex Oxycrato & farina fabarum ejus loco applicandum.

Catharticis interim & refrigerantibus modò descriptis introsumptis utendum est.

De Lue Venerea.

Ubi aut à Gonorrhœæ mora, aut indebito astringentium usu labes sanguini imprimitur, exoritur Lues. Comparent in inguine bubones, in capite dolores & artibus, articulorum interstitiis, noctu præcipuè invadentes in lecto calidòs, crustulæ & porrigines in variis corporis partibus, quæ ad instar favi flavescent. Quo magis scabies diffunditur, tanto minùs æger discrucietur. In cranio, tibiis barchiisq; exostoses, osium inflammatio & caries, ulcera phagædenica in variis partibus, sed fauces ut plurimum primò aggredientia, quæ sensim per palatum in nasi cartilagine propagata mox eam absumunt, ita ut fulcro destitutus nasus planè concidat. Ulceribus, carie & dolore indies exacerbatis, pereunt per vices membra; lacerum donec cadaver, & jam Superis grave humo condatur.

Rx Axung. Porc. ʒj. Mercur. crud. ʒi. M. f. Linimentum, in tres æquales partes dividendum, quarum unâ brachia, crura & tibiae ad tres noctes continuas manibus suis æger perungat.

Si

14

ò

to
ar,
o-
um
e-
iis
ef-
no
iis
&
ri-
re-
ar-
nt,
lat.
ba-
um
mo

. f.
en-
bias
ger
Si

Si
nem
Turbi
exhib
Merc
prius
tus d
eâdem
Pty
Nyct
Si
inflam
matis
dus
debit
Q
statim
at fin
Si
accid
tunc
dofin
opus
Si
la&e
luatu
R
donio
quo f
D
ac in

Si intra tres dies post ultimam inunctionem salivatio haud procedat, tum *gr. viij. Turbitb. mineral. in Conserv. Rosar. rubr. exhibeantur* ; aut corporibus minus robustis, *Merc. dulc. ℥j.* Sed si salivatio jam incœpta priùs elanguescat, quàm symptomata penitus disparuerint, extimulanda subindè est eadem dosi Mercur. dulc.

Ptyalismus ita moderari debet, ut *libij. Nycthemeri* spatio expuat, aut circiter.

Si justo altiùs exurgat Ptyalismus, cum inflammatione nimia, atq; id genus symptomatis ingruentibus, aliquantulum reprimens est medicamentis Catharticis, donec debitum gradum attingat.

Quamprimum symptomata cessaverint, statim immutentur indusium & tori lintea ; at sint ea, quæ priùs usurpata fuerint.

Si Diarrhœa supervenerit (quod plerunq; accidit antequam salivatio bene assurgat) tunc sistenda est usu Laudan. Liquid. ita dosim augendo atq; repetendo, ut debitum opus absolvar.

Si os exulceretur, *Aq. Ros. Damascen. vel lacte Aq. permisto, vel seq. decoct. idem colluatur.*

R. Rad. Altb. Hord. mundat. an. ℥i. sem. Cydonior. ℥℔. coq. f. q. aq. ad libij. M. f. Gargarisma, quo sæpius utatur.

Diæta & reliquum ægri regimen, eadem ac in Catharsi imperanda, nisi quod primis aliq;

aliquot diebus liquore possético, iusculis avenac. hordeac. ac cerevisiâ tenui repectâ nutritur.

His omnibus ritè peractis (etiamsi symptomata omnia evanuerint, ac subindè morbus penitus profligari videatur) quo minùs recidivam postliminiò patiatur, agro semel in septimana per 4 vel 6 vices, *Merc. dulc* ℥j. exhibendus, utcunq; bene se habeat, & etiamsi jam domo egrediatur.

De Fluore albo.

Quod effluit, modò album, modò pallidum, flavum, viride aut subnigrum, modò acre & erodens, tetrum quandoq; & graveolens, decoloratur facies, dolet spina dorsi, prostermitur appetentia, oculi pedesque intrumescunt.

Mittatur sanguis è brachio ad ℥viii.

℞ *Pil. Coch. maj.* ℥ij. *Castor. gr.* ij. *Balsam. Peruv. gutt.* iij. *f. Pil. N° iv.* cap. horâ quartâ matutinâ, superdormiendò; repetanturq; per duas alias vices interponendo diem unum vel alterum pro ratione virium.

℞ *Aq. Rut.* ℥iv. *Aq. Beyon. comp.* ℥ij. *Sacchar. Crystall. q. s. f. Fulapium;* Cap *Cochl* iij, vel iv. in omni languore; deinde aggrediatur usum sequentium.

ve-
nu-
np-
bus
di-
ep-
chi-
am

lli-
odò
eo-
rifi,
ru-

am.
artā
per
vel

bar.
vel
um

R T

Aurant

moschat

siß. cor

corall. r

ia an.

rum s. q

umat a

horâ qu

sem ino

nis Coc

R R

Calami

Marrub

salv. si

tur mi

itio. st

tumme

Ves

usu ol

singul.

Suc

di & in

sim lab

& qua

inanit

rum

spumo

℞ Theriac. Andromac. ℥i℥. Conserv. flaved.
 Aurant. ℥i. Diascord. ℥℥. Zinzib. condit. ℞ nuc.
 moschat. condit. an. ℥iij. Pulv. è Chel. cancr. comp.
 ℥℥. cort. exterior. granat. Rad. Angelic. Hispan.
 corall. rubr. præparat. ℞ Trochisc. de terra Lem-
 niæ an. ℥i. Boli Armen. ℞ j. Gumm. Arabic. ℥℥,
 cum s. q. Syr. de Resis siccis f. Electuar. de quo
 sumat ad magnitud. nuc. moschat. maj. manè,
 horâ quintâ pometidianâ, & nocte per men-
 sem integrum, superbibendo sequent. infusio-
 nis Cochl. vj.

℞ Rad. Enul. campan. Imperator. Angelic.
 Calami Aromat. an. ℥℥. fol. Absynth. Roman.
 Marrub. alb. centaur. min. Calamentb. vulgar.
 salu. sicc. an. M. j. Bac. Junip. ℥i. incidan-
 tur minutim ℞ infundantur in Vini Canarini
 libiv. stent simul in infusione frigida, coletur tan-
 tummodò tempore usûs.

Vescatur cibus eupeptis, & abstineat ab
 usu olerum & fructuum qualiumcunque, &
 singul. partibus bibat vinum Hispanicum.

De Diabete.

Succi sanguini illati per vias urinarias cru-
 di & inconcocti exitum sibi quærunt, unde sen-
 sim labefactantur vires, colliquescit corpus,
 & quasi substantia ejus per hanc cloacam ex-
 inanitur, cum siri, ardore viscerum, lumbo-
 rum coxarumq; intumescentiâ, & salivæ
 spumosæ expuitione crebrâ.

Eadem

Eadem præscribenda sunt, quæ in fluore albo, omissis solummodo Venæsectione & Catharsi.

De Doloze Hemorrhoidum.

Intensissimus inter excernendum dolor excruciat, & excrementi superficies cruore conspergitur: Nonnunquam tumores verrucis similes in sphinctere delitescunt, vel in margine ani apparent.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad ʒv.

℞ Sem. Melon. Pepon. an. ʒss. sem. papav. alb. ʒij. Amygd. dulc. excorticat. N^o v; contundantur in mortario marmoreo, sensim affundend. Aq. Hord. ʒiij. Aq. Rosar. ʒij. Sacchar. albiss. q. s. f. s. a. emulsio; cap. ʒiij. sæpiusculè.

℞ Flor. Sulphuris, Pulv. Glycyrrhiz. Salviae an. ʒi. cum s. q. Balsam. Lucatell. f. Pil. è sing. drachm. vi; cap. iij, ter in die, superbibend. Emuls. præscript. Cochl. vi.

℞ Aq. Spermat. Ranar. ʒiv. in qua dissolv. Lithargyr. ʒii. Opii ʒi; f. mixtura, cujus tantillo Linteum madefactum parum affectæ applicetur, vel si tumor intus lateat, Cochl.

ore
&

ex-
on-
ucis
ar-

var.
con-
fun-
bar.
iuf-

biq.
atel.
ten
ript.

qua
ctur.
partu
reat.
ochl.

ochil. in
jiciant
Pro P
ete coCl
s usu a
iacodiu

De

Innote
dintur
oris co
ergente
rops.
Eaden
um in
arfi.

Vel
uentibu
casu
peris
lutum
ft ren
mpus,
iffi co
rius)
olent h
oq; i

ochil. iii. ejusdem mixturæ modo Clysteris
 injiciantur.

Pro Potu ordinario bibat aquam cum
 ste coctam, vel aquam hordei; & à car-
 s usu abstineat. Singulis noctibus sumæ
 iacodium.

De fluxu Hæmorrhoidum immodico.

Innotescit ex viribus prostratis, copia
 diuturnitate sanguinis excreti, sædo cor-
 oris colore, ad citrinum (ut in Ictero)
 ergente. Succedit cachexia, & deinde hy-
 drops.

Eadem conferunt, quæ in fluxu men-
 um immodico, omisâ solummodò Ca-
 rsi.

De Epilepsia Puerorum.

Vel primo mense aggreditur à fre-
 quentibus nimis alvi dejectionibus (quo
 casu *Diascordium* ad quantitatem grani
 peris in *Aq. Saxifrag.* aut lacte materno
 lutum, & exhibitum præstantissimum
 est remedium.) Vel circa dentitionis
 tempus, à septimo ad decimum mensem,
 ussi comitata est, aut (quod multo de-
 rius) vomitu & diarrhœâ, viridia (ut
 solent hystericæ) egerente infante. Quan-
 toq; improvisò occupat paroxysmus, os
 ocu-

oculósque distorquens, nigredine vultum profundens, & artus varios covellens; quæque præsentitur ex digitorum in pugnum contractione, & ex stabili & insolita oculorum orbitalium immobilitate. Nunc seriùs, nunc ocyùs se proripiunt paroxysmi, certâ subinde periodo, vago aliàs insultu revertentes; se appetente morte, à tergo se invicem premunt: Si quando inducias dent, in sopore proclives sunt infantes, donec à novo resuscitentur insultu.

Applicetur *Emplestr. Epispastic.* cervicibus quamprimum.

℞ *Aq. Epilept. Lang. ℥iij. Laudan. I. quid. gutt. j, vel ij, vel plures, pro ratione ætatis, Syr. Pæon. ℥j. M. f. Haustus, sumendus quamprimum.*

℞ *Aq. Ruæ ℥iij. Aq. Epilep. Lang. Aq. Bryon. comp. an. ℥i. Syr. caryophyll. M. f. Fulap. cap. Cochl. j. singulis horis, haustus præscript. paroxysmum non fugaverit.*

De Rachitide.

In Rachitide adfunt partium laxitas mollities, debilitas & languor, ignavia & torpor, & inæqualis earundem nutritio.

pe
nd
co
oru
nu
bin
; fa
pa
ore
fuo

erv

L

e at
end

7.
7.
is,
fug

ras
a
riti
vi

caput
or, par
dis pr
alo m
n, offa
la, hin
numeri
tillant,
tus à la
n, abdo
tio, tun
decubiti
o.

& Fol.
rub.

g. Par
ca, sen
g. Pu

ior. c

M. j.

n. clare

er cine

at ad

ntur,

pocho

& art

s, vel

caput iusto majus, facies plenior & florior, partes carnosæ infra caput emaciantur, dis protuberant articuli, maximè carpi, alio minùs tali, tument & extremitates costarum, ossa incurvantur, præcipuè tibiæ & fibulæ, hinc ulnæ & radii, aliquando femoris humeri, dentes tarde & moleste erumpunt, scintillant, nigrescunt & frustulatim excidunt, stus à lateribus angustum, anteriùs acuminatum, abdominis repletio, & hypochondriorum visio, tussis & pulmonum vitia lacessunt, latera decubitus modò dextri, modò sinistri aver-

& Fol. Absinth. Vulgar. centaur. minor. rub. Alb. chamædryos, Scordii, calamenth. g. Parthen. Saxifrag. pratens. hyper. Virg. æ, serpill. menth. salu. Ruta, card. Bene- f. Pulg. Abrotan. chamæmel. Tanacet. ior. convall. omnium rec. collect. & incis. M. j. axung. Porcin. lbiiij. sev. ovin. & claret. an. lbii. macerentur in olla fictili per cineres calidos per horas xii. deinde ebulliant ad humiditatis consumptionem, & postea untur, ut f. Linimentum, quo venter & hypochondria illinantur manè & serò, ut etiam & artus hoc malo affecti, per 30 vel 40 dies, vel donec convaluerit.

R. Singulor. ingredient. præscript. an. M.
 infundantur frigide in Cerevisiæ non Lup
 lat. Cong. *iiij.* pro potu.

In Tumoribus Infantum ventres occupa
 tibus ab Evacuationibus nimis proceden
 tibus,

Sanguis & Viscera herbis corroboran
 bus confortentur, ut in Rachitide vera;
 quod axillæ etiam utræque inungantur,
 non artus.

De Febris & Dentitione Ortis.

Sp. C. C. gutt. ij, vel iij, vel iv. pro
tionem ætatis in Cochl. j. vel altero Aq. C
rafor. nigr. vel Julap. alterius appropriat
exhibeantur quarta quæque horâ ad vices qu
tuor, vel sex.

De Febre heſtica Infantum.

Sine insigni calore languent cum appe
 tûs dejectione, artus & truncus corporis em
 ciantur.

Rhabarb. incisi ℥ij. in lagenam vitream
visâ tenuis lbj. capacem immittantur prop
ordinario

M
up
upa
edo

ran
; T
ur,

ro
i. C
pria
s q

appe
s en

im
ro p

Ep

Epoto

superafflu

Si ven

prægnat

adjiciat

Phleb

solâ, ex

certinac

eniora

aque

eratis.

Dolo

Sang

ictus

ur; Ju

onib.

Sing

sq; on

exhibe

nun. p

Lim

qua

press

sapi

Epoto hoc liquore, *aliæ ſbj. eidem Rhabarb. ſuperaffundantur ad tertiam vicem.*

Si verò potus vi Catharticâ ſaturatius imprægnetur, tum ſbj. epotâ alteri cereviſia mox adijciatur.

De Tuffi Puerorum Convulſiva.

Phlebotomiâ, & repetitâ Catharſi, eâque ſolâ, expugnatur hæc tuffis, malum aliàs certinaciffimum, & fere inſuperabile; ſed ſeniora tantum cathartica hic conveniunt, eaque cochleatim ingerenda ſunt, pro ratione ætatis.

De Hemorrhagia Narium.

Dolor & calor ſinciput lancinant.

Sanguis è brachio frequenter extrahatur; ſiçtûs ratio refrigerans & incrassans injungatur; Julap. refriger. & incrassans, cum Emulſionib. refrigerantib. præſcribantur.

Singulis diebus injiciatur *Enema refrigerans*, atq; omni nocte *Paregoric. ex Syrup. de Mecon.* exhibeatur, & ſemel vel bis potio purgativa commun. præſcribatur.

Lintea quadruplicata immerſa Aq. frigide, in qua ſal *Prunell.* diſſolvatur, & poſtea leviter expreſſa admoveantur nuchæ, & utrinq; cervicibus ſæpius in die.

Post Evacuationes liquor seq. applicatur.

℞ *Vitriol. Hungaric. & Alum. an. ℥ss. Phlegmat. Vitriol. ℔ss. Coq. tamdiu, donec omnia fuerint dissoluta, liquorem frigesactum filtra, & à Crystallis subinde natis separa, liquorem residuo adde, Ol. Vitrioli duodecimam partem vel potius*

℞ *Ag. Plantag. ℥iij. Bol. Armen. subtiliss. pulver. ℥ss. probe misceantur; Turunda ex linteo raso liquore hoc humectata, nari, quo sanguis stillat, indatur per dies duos ita relinquenda.*

Hoc minus succedente, *Vitriol. Rom. commun. dissolvatur, qua Turunda imbuta nari indatur, liquore etiam hoc linteocmina imbuta & applicata sanguinem sistunt si ex parte externa diffluat.*

De Chlorosi.

Adsunt vultus & totius corporis decoloratio, intumescencia in facie, palpebris malleolis, gravitas totius corporis, crura ac pedum tensiva lassitudo, respiratio difficilis, cordis palpitatio, capitis dolor, pulsus febrilis, somnolentia, pica & mensium suppressio.

lice

z

en

fa

jun

cm

sub

una

i, e

ist

. A

na

but

ce o

olon

s

uru

dis

ouli

a fa

am

Summa
hybratum
plus m
haustum
tion. co
descript
rit, pun
ulum.

Cibu
color e
cipitis,
pedum
Eade
one ; a
rit, tum
Sing
sumat
land. Sp
mat cul
Syr. de
dact.

D.

In H
cum de

Sumat *Pilulas Chalybeatas*, vel *Pato. Chalybeatum* in affectione hysterica præscript. plus minus pro ratione ætatis, superbibend. haustum vini cuiuslibet ad libitum, vel infusion. corroborant. cum Rad. Angelic. ibidem descriptam. Si Ægra non valde debilis fuerit, purgetur semel vel bis ante præscriptorum usum.

De Suppressionione Mensium.

Cibum fastidiunt mulierculæ, fœdus faciæ color est, gravitas totius corporis, dolores principitis, lumborum, crurum & imi ventris; pedum tumores infestant.

Eadem præscribenda ac in Hysterica affectione; at si iisdem remediis affectus non cesset, tum seqq. sunt præscribenda.

Singulis Auroris, & quartâ pomeridianâ, sumat *Jalap. Hysteric. sine Castor. Cochl. v. instilland. Sp. C. C. gutt. xij.* Singulis noctibus sumat cubitum itura *Trochisc. de Myrrh. ʒj. cum Syr. de Artemis. in formam boli vel Pil. redact.*

De Vomitu sanguinis, vel etiam de Hæmoptoe.

In Hæmoptoe dolor & calor pectus obsident, cum debilitate quadam.

Mittatur sanguis ex brachio dextro ad 3j.
Sequenti mane sumat *portionem purgativ. com-*
muni & eadem nocte *Paregoric. ex 3ij. Aq. Ce-*
rasor. nigr. & Syr. de Mecon. 3i.

Postea aggrediatur usum sequent.

& *Bol. Armen. 3i. Pulv. Radic. Symphyt. 3ij*
Terr. sigillat. Lapid. hematit. & Sang. Dracon-
an. 3j. Sacchar. albiss. ad pondus omnium. M. f.
Pulvis subtilissimus, cujus cap. 3j. mane, quinta
pomeridianâ, & nocte, superbibend. sequent.
Apozemat. 3iv.

& *Fol. Plantag. Rabi Sylvestris, & millefol. an.*
M. j. coq. f. q. Aq. ad 1lb, in Colatura dissolv.
Syrup. de Symphyt. 3ij ; M. f. Apozema ; Vel
cap. Cochl. vj. sequent Tincturæ.

& *Flor. Ros. rubr. 3vi. Cort. intern. quere-*
3ß. sem. Plantag. parum contus. 3iij. Aq. font.
1bij. Sp. Vitriol. q. f. ad levem aciditatem, infun-
dantur in vase clauso, calore leni, per 4 horas ;
Colatur. adde Aq. cinnam. bordeat. 3iij. Sac-
char. albiss. q. f. ut f. Tinctura gustui grata.

Si ab usu Pulveris abhorreat, utatur E-
lectuario in fluxu mensium immodico præ-
scripto.

Enema quotidie injiciatur, & Diacodium
horâ somni propinetur.



3e
m
Ce

3j
con
1. f
mā
enn

an
olo
Veb

re
ent
un
s
ac-

E
a-

an

le-

Ph
(ut o
interp
repetat
Dia
da.

Hu
ficio v

R
teneri
Lin.
tis c
coctis
fero.

For
imbu
ceps
ter v
tur.

Phlebotomia insuper ſemel, bis, vel ter (ut opus fuerit) reiteretur, diebus aliquot interpoſitis ; & ſemel iterum, ſi res poſtulet, repetatur potio purgativa.

Dieta incrassans & refrigerans obſervanda.

De Punctura Tendinis.

Humor aqueus, vel ichor quidam, ex orificio venæ incisæ jugiter deſtillat.

℞ Rad. Lilior. alb. in lacte vaccin. ad teneritud. coct. & contuf. ℥.ii. farin. ſem. Lin. & Avenac. an. ℥.iiij. c. q. ad cataplaſmatis conſiſtentiam in eodem lacte, quo radices coctæ fuerint, applicetur parti affectæ mane & ſerò.

De Ambuſtis.

Foveatur pars affecta linteis Sp. Vini imbutis, uſque dum evaneſcat dolor, ac deinceps de novo imbuatur linteum, quod ſer vel quater in die parti affectæ applicetur.

De Mania communi.

A nimis exaltata & vivida sanguinis crasi oritur. Est & alia mania species febres intermittentes diuturniores excipiens, in stultitiam tandem degenerans, producta quidem à debilitate & vappiditate sanguinis, à diutina fermentatione. Præscribantur itaque cardiaca generosiora, viz. *Theriac. Andre-mach. Electuar. de ovo, Pulv. Comitiss. Pulv. Gualt. Rawleigh, in Aq. epidem. theriacal. vel aliâ*; & diæta instituatur analeptica.

In junioribus mittatur sanguis è brachio ad *℥viij.* vel *ix.* bis vel ter, diebus tribus inter singulas Venæsectiones interpositis. Tum semel extrahatur sanguis è venis jugularibus. Postea tota curatio innitatur sequenti Cathartico, quodumat tertiâ vel quartâ quaq; die, donec convaluerit; hoc interim observando, quod cum octies vel decies purgatus fuerit æger, exhibitio Cathartici ad septimanam unam vel alteram omittatur.

℞ *Pharmac. domestic. (i. e. Rad. Bryon. alb.) pulv. 3j. lactis vaccin. ℥iv. vel,*

R
dant
3i. M

R
Syr. C

M
festi
nis p
fectio
æger
inter
tur.

R
an. 3
tem C
netur

R
mat.
pars l
Braff

℞ Eiusdem ꝑß. vel ʒvi. Vin. alb. ʒiij. infundantur per noctem, in colatura dissolv. Syr. Violar. ʒi. M. f. Potio; vel, .

℞ Gombgeii gr. xiv. Aq. Cerasor. nigr. ʒiij. Syr. Caryophyll. ʒß. f. Potio.

De Contusionibus.

Mittatur sanguis è brachio lateris magis affectu ad ʒv. seq. mane exhibeatur potio communis purgativ. ac deinceps eodem modo Venæsectio & purgatio alternatim repetantur, donec æger convalescat. Interim toto decursu, si internæ partes lædantur, sequentia præscribantur.

℞ Decoct. Pectoral. lbß. Syr. Violar. cap. Ven. an. ʒij; f. Apozema; cap. lbß. ter in die. Item Ol. Amygd. dulc. rec. Cochl. j. sæpius propinetur.

℞ Ol. Amygd. dulc. unguent. Dialth. & Pomat. an. ʒi; M. f. Linimentum, quo ungatur pars læsa manè & serò, superimponend. fol. Brasicæ.

De furfure five porrigine capitis:

Potio purgans communis bis propinetur,
dein

*Rx Ol. Amygd. Amarar. ℥ Laurini, Cinc-
rum fol. Abrotani an. ℥i. misceantur probe,
℥ f. Linimentum, quo inungatur totum ca-
put singulis matutinis, diligenter infricando,
& postea superimponendo vesicam suillam.*

*At primum abradatur totum capillitium,
& postea defricentur squammulae sentim singu-
lis auroris, prout decidere pronæ fue-
rint.*

De Morsu canis Rabidi.

*Post 40 dies aut plures melancholica ad-
sunt symptomata, febris, sitis, hydrophobi-
a, & tandem partium extremarum convul-
sio.*

*Rx sp. vin. optimè rectificat. ℥v. Theriac. An-
dromach. ℥j. f. mixtura, qua illinatur pars læsa
ter in die, superimponendo linteum eâdem
mixturâ imbutum.*

[Faint vertical text or bleed-through from another page]

Pus
squar
luti fu
at ulcer
siores)
dysuri
festant
cida d
etiam
minim
rina.
ratum

R
Nº ix
do seq

R
phyll
cul. Pl
stillent
tur sol

R
bic. an
Cochl

De Ulcere Vesicæ.

Pus graveolens, aut sanguis nonnunquam squammulæ seu pelliculæ membranacæ ac veluti furfuracæ crustulæ (sin in renibus hæreat ulcus, carunculæ minutulæ, aliquando crassiores) unâ cum urina excernuntur, perpetua dysuria & continuus earum partium dolor infestant; renibus autem affectis ulcere, dilucida dysuriæ, & doloris dantur intervalia, pus etiam excretum copiosius est, album, leve & minimè foetidum, lacti similis profunditur urina: & longè post mictionem pus ab eo separatum in fundo residet.

Rx *Emplast. Flor. unguent. dict. 3℔; f. Pil. N° ix. cap. iij. horis medicinalibus superobibendo sequentis Aq. Cochl. vj.*

Rx *Rad. Fanicul. Consol. Aristoloch. & Caryophyll. an. ʒiij. fol. Agrimon. Hyper. Bugul. Santicul. Plantag. an. in. vj. incidantur minutim, & distillantur in vini alb. & lact. an. lbiv. & eliciantur solummodo lbiv. pro usu.*

Rx *Pulv. Rad. Consolid. maj. & gumm. Arabic. an. ʒi. Sacchar. Penid. ʒj; f. Pulv. cap. Cochl. j. bis in die.*

*De Asthmate inveterato in iis, qui sanguineo
temperamento præditi sunt.*

Dividitur in tres species; Dyspnœam, quæ difficilis est respiratio, in qua crebrior densiorque est spiritus trahit ex infarctu pulmonum sine stertore oriunda: Asthma, ubi frequens & magna respiratio in qua diaphragma, musculi intercostales, tum etiam abdominis, violenter moventur, cum stertore & sibilo. In priore specie substantia pulmonum, in posteriore bronchia oppilantur: Et Orthopnœam, quæ est maxima spirandi difficultas, sub qua ægrotantes non nisi sedentes, & erectâ cervicæ respirare possunt. Musculi etiam pectoris & scapularum vehementer exagitantur.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad ʒr. Die sequenti sumat *portionem purgativam communem*, quæ repetatur tertiâ quâque die per duas alias vices.

Diebus à Purgatione vacuis sumat sequentia.

R. Sem. Anis. subtiliss. pulv. ʒij. cum s. q. Balsam. Lucatell. ꝑ. pil. ex singulis drachmis ꝑ. cap. iij. manè & quintâ pomeridianâ, superbibend. decocti Amari sine purgantibus ʒiv. calidè.





Si Sy
de nov

Sensu
tur, vel
tas aut
Suma
tinis pe
per xxx
perbibe
in Scor

Rx 7
comp. &
ungant
mane &
Pler
scorbut
cùm hu
aliis ap
munt.

Tuf
vadit a
totum
à cibo
rubedi

Si Symptomata adhuc maneanr, reperatur
de novo integer Processus.

De paralyfi.

Sensus & motus in partibus quæ afficiun-
tur, vel simul, vel alterutra tantum facul-
tas aut prorsus extinguitur aut vitatur.

Sumat *pil. Coch. min.* ℥ij. alternis matu-
tinis per *vj.* vices; deinde capiat ter in die
per *xxx.* dies *Electuar. Antiscorbutic.* ℥ij. su-
perbibend. *Aq. Antiscorbutic. Cochl. vi.* Vide
in Scorbuto.

Rx *Unguent. Nervin.* ℥ij. *Sp. Lavendul.*
comp. & Sp. Cochl. hortens. an. ʒβ. *M. & in-*
ungantur partes affectæ, ut spina dorsi, &c.
mane & serò.

Pleraque præscriptorum, utut curationi
scorbuti solum destinari videantur; attamen
cum humores crudes ac fixos volatilifare præ-
aliis apta nata sunt, in Paralyfi etiam ponve-
niunt.

De tussi & Phthisi.


Tussis per se patet. Phthisis autem in-
vadit ab ætatis anno 18 ad 35. Extenuatus
totum corpus. Febris molestat hectica,
à cibo invalescens (quæ ex celeritate pulsus,
rubedinéq; genarum dignoscitur) materia per
E 5 tussim

tussim excreta cruenta est aut purulenta; in ignem coniecta tetrum spirat odorem, & immissa in vas aquâ repletum, fundum petit. Sudores nocturni superveniunt, livescunt tandem genæ, facies pallet, exacuantur nares; temporum quoque collapsus, unguium incurvatio, capillorum defluxio, & alvi profluvium colliquativum, mortem statim subsequituram denunciant.

Si Tussis recens fuerit, & nondum febrim, aut alia signa Peripneumoniam notham comitantia, accersiverit, vel si a Pleuritide, aut Peripneumoniâ, ob neglectam sufficientem Phlebotomiam, malè curatis eadem nequaquam orta fuerit, satis erit, ut æger per dies aliquot ab usu vini & carnis absteat, & his similibus remediis ad libitum utatur.

Balsamum sulphuris anisatum ad gutt. x. Cochlear. i. Sacchar. crystall. instillatum bis vel ter in die devoretur: ut etiam Tabellar. sequent. quas secum æger continuò portet, unam frequenter assumat.

Rx. Sacchar. cand. lb. ss. coq. s. q. Aq. font. usque dum adhærescat extremis digitor. tum adde pulv. Glycerhizæ, Enul. Campan. sem. Anis. & Angelic. an. ʒss. pulv. Irid. Florentin. Sulphur. an. ʒij. Ol. Chym. Anisi ʒij; f. j. a. Tabellæ domestica vocand. atque hoc interim Eclegmate utatur.



R O

an. 3i.

pius la

sis urge

In d

exhibe

Sin v

(præcip

vel si a

nem d

dere ;

da est,

ripneu

Ver

stantib

rit, sec

eos ad

ingress

dum.

R I

j. Sy.

tum f

ter in

gantib

37.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥ij. Syr. cap. Ven. Violæ.
an. ℥i. Sacchar. cand. q. s. f. Lohoch. de quo sæ-
pius lambat bacillo Glycyrrhizæ, quando tus-
sis urget.

In defluxione tenui *Eclegmata incrassantia*
exhiberi poterint.

Sin verò Tussis his remediis haud cessaret,
(præcipue autem si febrim comitem habeat,
vel si à Peripneumonia aut Pleuritide origi-
nem ducat) tum ineptum fuerit pectoralibus si-
dere; sed Venæsectione & Catharsi debellan-
da est, ut in methodo, quæ in curatione Pe-
ripneumoniæ nothæ describitur.

Verùmenimverò cùm, his omnibus non ob-
stantibus, Tussis non modò non curationi cessa-
rit, sed & diurnâ Pulmonum concussione
eos adeò debilitaverit, ut Phthisis tandem sub-
ingressa fuerit, tum hâc in methodo proceden-
dum.

℞ Balsam. Peruv. gutt. x. instillantur Cochl.
j. Sy. Hederae terrestris, vel si id minus gra-
tum fuerit ægro, Cochl. j. Sacchar. crystall. cap.
ter in die, superbibendo Decocti Amari sine pur-
gantib. ℥iv. vel (si idem ventrem moverit)
℥ij.

Sed omnibus aliis (quotquot adhuc inventa sunt) *Equitatio* ad satis longa & diutina itinera facile palmam præripit, hoc observando, ut si æger juvenilem ætatem prætergressus fuerit, plus temporis huic exercitio impendere debet, quàm si puer aut juvenis esset, & sanè haud multò certius *Cortex Peruv.* febris intermittenti, quàm in hac ætate *Equitatio Phthisi* medetur.

V

De Scorbuto.

Adfunt spontaneæ lassitudines, corporis gravitas, dyspnœa, præcipuè ex motu corporis, gingivarum putrefactio, oris graveolentia, sanguinis è naribus crebra eruptio, ambulandi difficultas, crurum nunc intumescencia, nunc extenuatio, in iisdem perpetuo maculæ lividæ, plumbeæ, flavæ, aut violaceæ, faciei color plerumq; ex pallido fuscus.

Extrahatur sanguis è brachio ad ℥viij. nisi signa Hydropsis adfuerint: Seq. mane exhibetur Potio Purgat. communis, quæ repetatur tertiâ quâq; die per duas alias vices.

Diebus à purgatione vacuis, ut etiam postea, per mensem unum vel alterum sumat sequentia.

R
zi. pu
rior. f.
mosche
nocte,
vj. vel

R
Ari ity
Nastur
Cochl.
Vin. A
elician
Vel
pro ul
Por
rio.

R
fol. Coc
Auran
vitrean
mox pr
In l
fex La
aliae,
deince
Vic
ij. ve
lus po

℞ *Conserv. Cochl. hortens.* ℥ij. *Conserv. Lujul.* ℥i. *pulv. Ari compos.* ℥vi. *cum s. q. Syr. Aurantior. f. Electuar.* de quo cap. ad magnitud. nuc. moschat. maj. manē, quintā pomeridianā & nocte, superbibendo *Aq. Raphan. compos. Cochl.* vj. vel sequentis.

℞ *Rad. Raphan. Rustican. raspat.* lbij. *rad. Ari lbj. fol. Cochl. hort. M. xij. fol. Menth. Salv. Nasturt. aquat.* ℞ *Becabung. an. M. vj. Sem. Cochl. hort. parūm contus. lbj. nuc. Moschat. ℥℔.* *Vin. Alb. lb. xij. distillantur organis communib. ℞ eliciantur solummodo lbvj. pro usu.*

Vel *Felia rec. Cochl. hortens.* per se distillantur pro usu dicto.

Porro sequens cerevisia sit pro potu ordinario.

℞ *Rad. Raphan. Rustican. recentis incisi* ℥ij. *fol. Cochl. hort. N° xij. passular. enucleat. N° vj. Aurant. cum toto incisi dimidium, in lagenam vitream lbj. Cerevisiæ tenuis capacem subere mox probè obturandam immittantur.*

In hunc modum parentur eodem tempore sex Lagenæ pro usu, & post aliquot dies sex alia, antequam priores exhauriantur, & sic deinceps; vel,

Vice hujus Cerevisiæ seq. mixturæ *Cochl.* iij. vel iv. immisceri poterint singulis haustus potus communis.

℞ Rad. Raphan. Rustican. ℥ sem. Cochl. hortens. an. ʒss. fol. Cochl. hortens. M. ij. pulpam unius Aurant. Contundantur simul in mortar. marm. sensim affundendo vin. alb. itss. Coletur cum levi expressione, & reponatur pro usu.

Eadem remedia, Phlebotomiâ & Catharsi omissis, in Rheumatismo scorbutico, sive Hysterico, valde profunt.

Tabis Descriptio & Cura.

Plures sunt Tabis species : Prima ferè oritur è frigore hyeme contracto. Paulo enim ante solstitium Brumale quamplurimi ab ingruente tempestate frigidâ, tussi tentantur : Quæ cum illos invaserit quibus pulmones ab ortu sunt infirmiores, omnino necesse est ut à repetitis Tussiendo conatibus magis adhuc debilitentur ; atq; ita tandem alimento sibi proprio assimilando, præ mala *diabesi*, profusimpares reddantur. Hinc jam ingers irritæ crudæ copia aggeritur, quæ continuâ pulmonum agitatione & vehementi nisu assatim per os rejicitur. Pulmones exinde pure referti purulenta *puscula* quaquaversum in carnes dispergunt. Hinc nascitur Febris putrida, cujus Paroxysmus sub vesperam fatigat, sub auroram vero sudore copioso ac vires imminuente solvitur. Denique ad malorum cumulum Diarrhœa succedit, partim ab humoribus putridis ex arteriis Mesentericis in

inte-

intest
lesach
ira d
fungi
strave
Tabis

Po
lis hu
subit
beatu
per in
per I
cupa
Asper
tarrh
vehem
litate
brevis
tural
tueri
sei so
denti
sanie

U
ces
Tent
causa
Cubi
medi
morb
ubi

intestina depositis excretisque, partim à labefactato pellundatoq; viscerum Tono. Atq; ita demum æger proximâ æstate fato suo fungitur, à morbo, cui prægressa Hyems viam straverat, extinctus. Atq; hæc est præcipua Tabis species.

Porro cùm sanguis hac tempestate particulis humidis admodum scateat, perspiratioq; à subitâ pororum contractione plus satis inhibeat, particulae hæ in pulmones depluunt per interspersos Venæ Arteriosæ ramos; vel per Ductus Salivales in glandulis fauces occupantibus reponuntur; unde jam humor per Asperam Arteriam delapsus in Pulmones, Catarrhi ritu, eos ita jugiter irritat, ut creber & vehemens tussendi conatus, tum illam debilitatem, tum alia quæ diximus symptomata, brevi accersat. Cumq; non jam amplius naturalem sibi pulmones œconomiam statumq; tueri valeant, Glandulae & Tubercula adnasci solent; quæ in ægis ex hoc morbo decedentibus, si aspiciantur pulmones, purulentâ sanie ut plurimum distenta reperiuntur.

Ubi semel invaluerit hic morbus, & radices egerit, remedia plerumque aspernatur. Tentari utcunq; potest Medicatio, minuendo causam deflexionis in pulmones, pertusâ in Cubito Venâ, Catharticis mitioribus; tum medicamentis pectoralibus dictis, ad varios morbi status acomm datis, incrassantibus sc. ubi humor subtilior & tenuior vim Expultri-

cis facultatis videtur eludere; attenuantibus vero ubi pituita crassior ægre & cum molestiâ per os rejicitur. Dein & hæctica Febris remediis refrigerantibus contemperantibusq; coerenda. Talia sunt *Lac Asininum, Aqua Lactis Stillatitia, Emulsiones ex Amygd. dulo. Sem. Melon. Pepon. Papav. alb. Ag. Fl. Paralyf. &c.* Deniq; & curando Ulceri opera danda est; cui rei Terebinthina illa liquida, Opobalsamum vulgo dicta, apprimè conferre censetur.

Hujusce Morbi Curatio, me Judice, hæc methodo optimè ac felicissimè instituetur. Primum educatur è brachio sanguis, dein subducatur Alvus ad tres dies continuos, vel *Pil. Cochli majoribus*, vel *Decocto leniente à nobis præscripto*. Tertiâ nocte exhibeatur *Sy. de. Mec. ʒß.* Intermissio biduo, triduove, pro re natâ repetatur Purgatio, idq; toties fiat quoties opus esse videatur, donec symptomata vel prorsus evanuerint, vel saltem mitescant. Post singulas Catharces jam finitas capiat Opobalsamum gut. xx. Sacchari particulæ majori instillatas permixtasq;, nihil superbibendo. Vel *Pil. è Terebinth. ex Insula Chio cum Saccharo cando confectam*. Opobalsamum non assumendum est nisi prægressis evacuationibus debitis. Hujus loco *Electuarium è Balsamo Lucatelli, Glycyrrh. pulvere, semine Anisi & Terebinthina concinnatum* poterit substitui. Post evacuationes sedulo conandum est, ut Tussis sedetur, & Pulmones jugi agitatione infirmiores evadant.

dant
lauda
& De
Capill.
Medic
catarr
sistet;
jampr
rint.
iniisd

At
dium
Et qu
tradiu
nullo
com
Quib
value
tum a

Est
longe
Hæc
liori f
partic
guine
nimic
lorem
nibus
matu
pmic
pus c

dant. Huc facit præ cæteris Syrupus jama-
 laudatus, qui hac formula possit usurpari.
& Decoct. Pectoral. lbj. Syr. de Mecon. Syrup.
Capill. Ven. an. ℥ij. Cap. Cochl. v. ter in die.
 Medicamentum hoc ita frequenter haustum
 catarrhum in Pulmones depluentem paulatim
 sistet; eosq; in pristinam *ευσχίαν* reducet, nisi
 jampridem à naturali statu nimium recesser-
 rint. Promovebit insuper purulentæ materiæ
 in eisdem aggestæ concoctionem.

At vero Palmarium hujusce Morbi præsi-
 dium est, ut Æger quotidie Equo vehatur.
 Et qui se huic corporis exercitio sanandum
 tradit, nullis jam Diætæ legibus adstrictus,
 nullo Cibi potusve genere privandus est :
 cum in hoc uno omnis rei cardo vertatur.
 Quibusdam eorum qui ex hac methodo con-
 valuere, tumor in collo exortus est non mul-
 tum à Scrophulis abludens.

Est & alia Tabis species à Tussi prognata,
 longe diverso anni tempore, initio sc. æstatis.
 Hæc Juvenes persæpe illos invadit qui debi-
 liori sunt corporis habitu, & quorum sanguis
 particulis calidis acribusque refertus est. San-
 guinem isti e pulmonibus per tussim exantlant,
 nimio meri potu prius excalescenti. Ægri do-
 lorem sive ægritudinem quandam in pulmo-
 nibus persentiscunt : Quæ Symptomata nisi
 maturè remediis appropriatis eliminentur,
 primò scabrities, mox & ulcus accedit, unde
 pus confectum demum expuitur.

Diætæ

Dicta jam Tabis species Venæsectione & Catharfi bis alternatim repetitis, saltem in principio, facile vincetur: Si Diætâ insuper Refrigerante & Incrassante utatur æger, & à carnibus in solidum abstineat.

Tertia hujus Morbi Species ortum debet materiæ Febrili in pulmones, Febre jam fatifcente, amandatæ; qui sensim infirmiores redditi à symptomatis jam memoratis vexantur.

Quandoq; oritur à sanie istâ purulentâ quæ à Pleuriticis non satis copiosè per expectorationem egeritur. Quo in casu eandem quam Empyema, Curationem postulat.

Sunt etiam qui à nimis copiosis, & debito frequentioribus evacuationibus debilitati in quartam Tabis speciem præcipitantur. Hos calor Hecticus à Cibo potuq; sumpto, sub noctem lacescit: Atq; hos præ cæteris Aphthæ infestant.

De Podagra.

• Exeunte Januario aut incipiente Februario, ingruit horâ fere secundâ matutinâ, dolore pollicem pedis ut plurimum occupante, quandoq; vero calcaneum, suram aut talum, mox sequitur rigor cum horrore, & febricitatione aliquali, dolor gradatim intenditur (& pari passu rigor atq; horror recedunt) idq; in singulas horas, donec tandem sub noctem ad apicem pervenerit, nunc tensionem violentam, nunc morsum canis rodentis, quandoq; pressuram

k
n
r
a
f
-
s
-
e
-
i
o
n
s
o
e
-
e
-

ram, & c
quisito
tum po
one co
dolor no
tertiam
meri sp
dore pe
gilans,
sectam
quenti
doler n
advespe
cantu.
ore to
exercu
abrorm
num du
xymul
Podag
in iis
rius in
oribus
mensil
diutun
valedi
A
rator
nulis
titus
spera

ram, & coarctationem exprimens; hinc præ exquisito dolore, nec linteorum superincumbentium pondus, nec cubiculi à fortiori ambulatione concussionem ferre Podagricus valeat; dolor non sedatur, nisi ante horam secundam, tertiamve matutinam (decurso scilicet nycthemeri spatio à primo appulsu) & jam leni dolore perfusus æger somno concedit, à quo evigilans, dolore multum imminuto, partem affectam tumore recenter occupatam cernit. Sequenti die, fortè etiam ad bidduum, triduumve dolet nonnihil pars affecta, idq; vehementius ad vesperscens die, levatur autem sub galli cantu. Intra paucos dies alter Pes eodem dolore torquetur. Postquam utrumq; pedem exercuerit dolor, qui sequuntur Paroxysmi enormes sunt, tum quoad tempus invasionis, tum durationem; atq; ex serie horum paroxysmorum, constat paroxysmus, qui dicitur Podagra, diuturnior breviorve pro ægri ætate in iis qui vegetiores sunt & quos Podagra rarius invasit, diebus sæpe quatuordecim, in senioribus atque iis quos sæpius afflixit, duobus mensibus ferè desinit, iis verò qui vel annis, vel diuturniore morbi mora fracti sunt, non prius valedicit, quàm æstas jam adultior eam fugaverit.

Ad quatuordecim primos dies urina coloratior est, cum sedimento rubro, & quasi arenulis referto, alvus ferè constipata est. Appetitus prostratio, rigor totius corporis sub vespere, integrum Paroxysmum comitantur, re-

recedentem Paroxysmum excipit pedis affecti inter digitos pruritus vix ferendus, unde decidunt surfures, & pedes desquamantur.

Haecenus dolor pedibus tantum fuerit infestus, cum verò vel ab indebita medicatione turbatur Podagra, vel ob diuturnam morbi pertinaciam, corporis substantia quasi in morbi fomitem pervertitur, jam manus, carpos, cubitos, genua, aliasq; regiones occupat; quandoque unum, pluresve digitos distorquens, fasciculi radicum pastinacæ similes eos reddit, morbi paulatim privans, tandemq; concretiones, circuli articularum ligamenta, tophaceas generans cretam, vel oculos cancrorum æmulantes; nonnunquam in cubitis tumorem subalbum ceteris ferè ad ovi magnitudinem, qui sensim inflammatur cum rubore, nonnunquam femur occupans, sensum exhibet quasi ingentis ponderis appensi, sine dolore tamen notabili, at genu exinde petens, id acrius urget, artus jam habet æger fere undequaq; contractos & impeditos, ita ut claudicet, & permolestè prorepat. Urina illam colore imitatur, quæ in diabete excernitur, dorsum aliæq; partes moleste pruriunt, maxime sub horam somni.

Post multos, dirosq; cruciatus Paroxysmi subsequentes (naturâ partim onere materię peccantis, partim senio oppressâ) ægrum quoad dolorem clementius tractant, at loco doloris consueti, ægritudo quædam cum dolore ventris, lassitudo spontanea, quandoq; etiâ pro-

pensio

fi
nd
in
on
orb
orb
cu
loc
ula
on
rca
ans
on
ien
im
cu
eris
nu
bet
os
ina
er-
nt,
mi
ia
ad
is
n-
ro-
io

ratio ad
omata
tigat, a
ne, qua
us longa
Calculu
fectus.
Fœmina
m vetula
venibus
Indican
ni confu
er Pharm
tationem
s non-n
Venæse
am non
culo, 8
ant, non
am Ma
ost Purg
Medica
cisfaciun
el amari
a sunt, A
in. cham
antiscorb
chl. bor
surpand
abdunt,
riticalon
borant.

passio ad diarrhœam superveniunt; quæ symptomata evanescent, quoties articulos dolor tigeat, atq; ita nunc dolore, nunc ægritudine, quasi alternatim laceffentibus, Paroxysmus longas moras neçtit.

Calculum Renum in quamplurimis parit hic effectus.

Fœminas perrarò infestat, easque, non nisi in vetulas, & viragines, pueros quoque, & venibus minores vix adoritur.

Indicatio Curativa in eo vertitur, ut cocti- ni consulatur, indigestionibus sublatis, seu fit per Pharmaca, seu victus rationem, seu ex- ercationem, seu alia ex istis quælibet, quæ sex- as non-naturales indigitantur.

Venæsectio, Catharsis, ac Diaphoresis sco- am non attingent, licet iis qui *Renum* simul calculo, & exindè orto *Mictu sanguineo* labo- rant, non abs re erit, semel in septimana, al- iam *Mannâ* subducere, & singulis noctibus, post Purgationem Paregoricum exhibere.

Medicamenta, quæ prædictæ indicationi- tis faciunt, ea sunt, quæ moderatè calent, & el amaricant, vel linguam leniter feriunt, ta- a sunt, *Rad. Angelic. enuls. fol. Absinth. cent. in. cham. cham. ep. Sc.* quibus addi possunt antiscorbutica dicta, ut, *Rad. raph. rustic. fol. bel. hort. nasturt. aq. Sc.* quæ tamen parcius surpanda veniunt, quia morbi fomiti aculeos- abdunt, & calorem augent, præistis aliis, quæ- itici calore, atq; amaritudine, ventriculum cor- borant. Haud inutile est *Electuar. sequens.*

R. Con-

℞ *Conserv. cochl. hort. ℥i℥. Absinth. Rom. f. an. ℥i. Angel. condit. nuc. mosch. cont. an. ℥℥. Theriac. Androm. ℥iij. Pulv. ari com. ℥ij. cum s. q. Syr. Aurant. f. Elect. de quo sum. ℥ij. bis in die, superbibendo seq. Aq. distilla. Cochl. v. vel. vj.*

℞ *Rad. raphan. rustic. incis. ℥iij. Cochl. hort. M. xij. nasturt. Aq. becabung. salu. menth. a. M. iv. cort. aurant. N° vj. nuc. mosch. cont. N° i. cerv. Brunsvicens. lbxij. distillantur organ. communibus, donec solummodo lbvj. aqua eliciantur pro usu.*

Hæc autem remedia *digestiva*, constante atq; omni adhibitâ diligentia, assiduè usupanda, & in *paroxysmorum* intervallis præcipue in usum revocanda sunt.

Mediocritas ea in cibo observanda est, neq; plus alimenti ingeratur, quam ventriculus concoquere valeat, neq; è contra nimis abstinentiâ, partes eâ proportionè alimenti defraudentur, quæ earundem robur & vigorem sustinere potis est. Quoad qualitatem autem ciborum, ægri palato consulendum est, & unica ciborum specie singulis pastibus vescatur; de cæteris, demptâ carne, pro libitu comedat, modo nec acria, nec sale condita sint, nec aromatis. Prandere tantum expedit, loco autem cœnæ indulgeat sibi haustum cerevisiæ alicujus tenuioris, quo calculi concretio impediatur.

Liquores optimi sunt, qui neq; ad vini generositatem ascendunt, nec ad aquæ debilitatem, ne frigore suo lædant ventriculum, deprimuntve.

f. 10
 con
 om
 am
 He
 f. 11
 an
 10
 an
 qua
 nter
 fur
 eci
 u
 cu
 m
 de
 rem
 rem
 ni
 tur;
 lat,
 ro
 em
 cu
 tur.
 ge
 ra
 pri
 ve.

antive.
aut mult
autem p
universa
generave
tūvis l
Diatro e
ubi prim
quum vi
Sin au
orientium
ora nim
coquere,
algeat,
Eger
petat, d
nimis in
ro omn
ile pal
everans
quoad e
ec cal
equitati
rectio in
Vener
na nulla
Quan
f, con
primum
usculo
autem
sunt, n
quam v
autem v
ut pot

antive. Hujusmodi est *Cerevisia tenuis Londinensis*, aut multa aqua, cum paucio vino permixta; aqua autem pura & cruda periculosa est: cum autem universa ferè corporis substantia, in podagram degeneraverit, à liquore quocunq; fermentato quantumvis leni, & tenui abstineat, & utatur *Decocto Diatico ex Sarfa*, in *remediorum formulis* descripto, ubi primum à paroxysmo convaluerit, per reliquum vitæ cursum.

Sin autem æger à longo, & nimio liquorum inebriantium usu, vel ab ætate proVectiore, vel deniq; præ nimia debilitate, cibos absq; vino nequeat consequere, ia pastibus haustum vini Hispanici sibi indulgeat, *Apozema Dieteticum* abdicans.

Æger maximè hyemis tempore, maturè lectum petat, diluculo exurgat, animus sit tranquillus, nec nimis intentus studiis, & rebus seriis; cæteris vero omnibus, exercitatio corporis quotidiana facile palmam præripit, quæ moderata sit, & perseverans, nullo autem modo justo vehementior; quoad exercitii genus, quoties nec grandior ætas nec calculus intercedant, reliquis præferenda est equitatio constans, ac assidua in aere salubri, aut lectio in curru.

Veneris lenociniis ne indulgeat: Remedia externa nulla adhibenda.

Quamvis nihil magni in paroxysmo tentandum sit, conducet tamen fortasse per aliquot dies, ubi primum à morbo corripitur, à carnibus abstinere, osculo uti avenaceo, aut alio pari alimento; sin autem spiritus animales ataxiam concipere apti sunt, non expedit à carnibus abstinere diutius, quam ventriculus earum usum adversetur: ne quid autem vel in quantitate, vel in qualitate, ciborum aut potus peccet.

Symptomatis iis occurrendum est, à quibus ager in paroxysmo de vita periclitatur : horum maxime familiare est, ventriculi languor, cum ventris torminibus, tanquam à flatu : hoc in casu, nihil æq; votis respondet, ac vini Canarenfis haustulus subindè deglutitus, exercitio utatur æger : si autem symptoma, inducias haud ferens, moriem minitetur, modo caput malum non impetat, ad *Laudan.* statim confugiendum, viz. gutt. xx. in haustulo *Aq. Epidem.* & in lecto ad quietem se componat : hanc ipsâ methodo, se ab imminente morte liberavit auctor clarissimus, ubi ex errore aliquo, circa res sex non naturales, in ingentem ventriculi ægritudinem incidit, cum vomituritione, & aliquali ventris dolore, rtus interim, ex retrocessione materiæ Podagricæ, doloris erant expertes, ac ad motum plus solito habiles. Congium nempe unum liquoris possetici, vel cervisiæ tenuis devorabat, & quamprimum totum per vomitum rejecerit, Vini Canar. haustulum, cui instillatæ fuerint *Laudan. liq. gutt. xvij.* sumebat. Quod si huic remedio symptoma non cedat, sudor provocetur, methodo & medicamentis huic usui dicatis, ad biduum, triduumve, manè & vespere per duas tresve horas continuas.

Si autem metastasis fuerit materiæ peccantis in Pulmonum lobos, liberatis artubus à dolore, & tumore, tractandum est hoc symptoma pari modo ac Peripneumonia absoluta, venæsectione scilicet repetitâ, diætâ, & remediis refrigerantibus, & incrassantibus; purgandus est insuper æger, inter venæsectiones, potionibus lenientibus : sudoris autem provocatio obest.



ti-
is
ill
us
u-
ni-
u-
u-
ni-
te
uo,
ri-
8
o-
r-
m
e-
ni-
li-
ed
o-
ti-
ri
is
e,
ri
de
n-
r,
o-